

CATALOGUE

DES

PLANTES MÉDICINALES

ET ÉCONOMIQUES,

SUIVANT leurs caractères génériques & spécifiques ,
conformément à la Méthode sexuelle du Chevalier
LINNÉ.

DÉMONTRÉES par le sieur ANTOINE BANAL
cadet , Jardinier Botaniste du jardin royal des
plantes de Montpellier.




A MONTPELLIER,

Chez JEAN-FRANÇOIS PICOT , seul Imprimeur du
Roi & de la Ville , place de l'Intendance.



M. DCC. LXXXIV.

348241



P R É F A C E.

IL n'est point d'école de Médecine où la Botanique ne soit regardée comme une des branches les plus essentielles de l'art de guérir. L'étude de cette science n'a eu pendant long-temps pour objet que les plantes auxquelles on avoit reconnu des propriétés économiques ou médicinales. La curiosité des hommes ne se borna pas à ce petit nombre d'individus d'un regne qui fait le plus bel ornement de la surface de notre globe ; elle se porta sur tous les végétaux sans distinction. Des Savans du premier ordre s'occupèrent à les nommer & à les décrire. Mais comme ils ne les considérèrent pas sous le même point de vue , comme les dénominations furent arbitraires , on auroit bientôt fini par ne plus s'entendre , si les BAUHINS , par leurs synonymies , les TOURNEFORT & les LINNÉ , par leurs systèmes , n'avoient débrouillé ce cahos capable de rebuter les plus intrépides Amateurs de la plus belle , de la plus agréable des sciences. Cependant les travaux précieux de ces grands Hommes , en facilitant l'étude , n'en ont pas fait disparaître toutes les épines. La Botanique sera toujours longue & difficile à apprendre , parce que les individus qu'elle embrasse sont très - variés & très - nombreux. Aussi la plupart des jeunes gens qui se destinent à la pratique de la Médecine , de la Chirurgie , ou de la Pharmacie , se contentent de la connoissance des plantes usuelles. C'est pour la faciliter que j'ai fait imprimer ce Catalogue. Les plantes qui sont d'usage en Médecine ; & la plupart de celles qu'on emploie dans les Arts , y

sont rangées suivant l'ordre du *Systema naturæ* du Chevalier LINNÉ. Presque tous les Savans de l'Europe se réunissent en faveur du systême sexuel de cet illustre Auteur. J'ai cru ne pouvoir mieux faire que de me conformer à d'aussi bons Modeles. J'ai emprunté les caracteres génériques & les phrases spécifiques de l'Édition du *Systema Vegetabilium* de MURRAY & du *Systema Plantarum* de REICHARD. J'y ai joint les phrases de M. PITTON DE TOURNEFORT, & les noms François les plus connus de chaque plante. Je n'indique pas les noms Patois, parce que chaque Province ayant son idiome particulier, ces noms varient à l'infini. Plusieurs raisons m'ont décidé à ne faire aucune mention des propriétés des plantes. 1°. Parce que mon objet est de faire connoître les plantes, & non d'indiquer leurs vertus. 2°. Parce qu'une matiere médicale, pour être bonne, doit spécifier les cas où chaque substance convient, les cas où elle est contr'indiquée, la maniere de l'employer, &c. & je ne me suis proposé que de faire un Catalogue des plantes usuelles & non un ou plusieurs gros volumes. 3°. « Parce que les jeunes Botanistes, s'ils » trouvent les propriétés réunies à la nomenclature, » négligent souvent le caractere des végétaux pour s'attacher aux effets qu'ils sont capables de produire, & » dont ils pourroient s'instruire par-tout ailleurs que dans » les Herborisations (1) » ou dans un jardin. J'expose au commencement l'explication du nom des Classes de M. LINNÉ. Les bornes de ce petit Ouvrage ne me permettent pas de m'étendre sur les principes & sur la langue de la Botanique. Je ferai tous mes efforts pour en rendre l'intelligence facile à ceux qui m'honoreront de leur présence & de leur attention à mon cours particulier.

(1) *Flora de Bourgogne par M. DURAND.*

EXPLICATION du nom des classes du système de M. DE LINNÉ.

LE système du Chevalier DE LINNÉ est nommé système sexuel, parce qu'il est fondé sur le sexe des plantes. Les étamines qui en sont les parties mâles forment la première division en 24 classes. Le pistil qui est la partie femelle forme la seconde, c'est-à-dire la division de chaque classe en ordres. Chaque ordre renferme sous lui les genres & les espèces. Le nom des 24 classes est formé de deux mots grecs qui en expriment le caractère.

Classes.

I. Monandria.	Une étamine dans une fleur
<i>Monos aner.</i>	hermaphrodite.
Un mari.	
II. Diandria.	Deux étamines dans une fleur
<i>Dis aner.</i>	hermaphrodite.
Deux maris.	
III. Triandria.	Trois étamines, &c.
IV. Tetrandria.	Quatre étamines.
V. Pentandria.	Cinq étamines.
VI. Hexandria	Six étamines.
VII. Heptandria.	Sept étamines.
VIII. Octandria.	Huit étamines.
IX. Enneandria.	Neuf étamines.
X. Decandria.	Dix étamines.
XI. Dodecandria.	Douze étamines.
XII. Icosandria.	Une vingtaine ou plus d'éta-
<i>Eicosi aner.</i>	mines attachées au calice.
Vingt maris,	

Classes.

XIII.	Polyandria. <i>Polys.</i> Plusieurs.	Plus de vingt étamines attachées au réceptacle.
XIV.	Didynamia. <i>Dis dynamis.</i> Deux forces.	Quatre étamines dont deux grandes & deux petites.
XV.	Tetradynamia. <i>Tetra.</i> Quatre.	Six étamines dont quatre grandes & deux petites.
XVI.	Monadelphia. <i>Monos adelphos.</i> Un frere.	Plusieurs étamines réunies par leurs filets en un corps.
XVII.	Diadelphia. <i>Dis.</i> Deux.	Plusieurs étamines réunies par leurs filets en deux corps.
XVIII.	Polyadelphia. <i>Polys.</i> Plusieurs.	Plusieurs étamines réunies par leurs filets en trois ou plusieurs corps.
XIX.	Syngenesia. <i>Syn genesis.</i> Ensemble génération.	Plusieurs étamines réunies en forme de cylindre par les antheres ou sommets, rarement par filets.
XX.	Gynandria, <i>Gyne aner.</i> Femme mari.	Plusieurs étamines unies & attachées au pistil, sans adhérer au réceptacle.
XXI.	Monoecia. <i>Monos oikia.</i> Une maison.	Fleurs mâles & fleurs femelles séparées sur un même individu.
XXII.	Diœcia. <i>Dis oikia.</i> Deux maisons.	Fleurs mâles sur un individu, & fleurs femelles sur un autre de même espece.
XXIII.	Polygamia. <i>Polys gamos.</i>	Fleurs mâles sur une plante, Fleurs femelles sur une au-

Classes.

Plusieurs nœces. tre de même espece ; &c
fleurs hermaphrodites ,
tantôt sur l'une , tantôt
sur l'autre.

XXIV. Cryptogamia. Fleurs renfermées dans le
Cryptogamos. fruit ou presque invisibles.
cachées nœces.

O R D R E S.

Les Ordres sont fondés sur le nombre des pistils dans les treize premières Classes. Ainsi le premier ordre d'une Classe comprend les fleurs qui n'ont qu'un pistil. Il se nomme Monogynia.

Monos gyne

Une femelle.

Le second ordre comprend les fleurs qui ont deux pistils ; &c Digynia , &c.
ainsi de suite.

Enfin l'ordre des fleurs qui ont un certain nombre de pistils se nomme Polygynia.
Plusieurs.

La XIV^e. Classe est divisée en deux ordres dont la distinction est tirée de la disposition des graines.

Gymnospermia. Quatre semences nues , à dé-
Gymnos sperma. couvert au fond du calice.
Nue semence.

Angiospermia. Semences renfermées dans un
Angion. péricarpe.
Vase.

La XV^e. Classe se divise en deux ordres d'après la figure du péricarpe.

Siliculosa.

Le péricarpe presque arrondi.

A petites siliques.

Siliquosa.

Le péricarpe allongé.

A siliques.

Les Classes suivantes , depuis la seizieme jusqu'à la vingt-troisieme inclusivement , à l'exception de la dix-neuvieme , tirent la distinction de leurs ordres des caracteres classiques de toutes les Classes qui les précédent. La dix-neuvieme est divisée en six ordres. Les fleurs des cinq premiers sont toutes des fleurs composées.

Polygamia æqualis.

Les fleurons sont tous herma-

Polygamie égale.

phrodites , tant dans le disque que dans la circonférence de la fleur.

Polygamia superflua.

Fleurons hermaphrodites dans le disque , femelles dans la circonférence , tous fertiles.

Polygamia frustranea.

Fleurons hermaphrodites dans le disque , stériles à la circonférence.

Polygamia necessaria.

Fleurons hermaphrodites dans le disque dont la femelle est stérile. Femelles à la circonférence.

Polygamia segregata.

Fleurons de différentes especes avec un calice , renfermés dans un calice commun.

Monogamia.

Fleurs qui , sans être composées de fleurons , ont leurs étamines réunies par leurs antheres.

Les ordres de la vingt-quatrieme classe sont composés des familles naturelles : fougères , mousses , algues , champignons.



CATALOGUE

DES

PLANTES MEDICINALES ET ÉCONOMIQUES.

CLASSIS I^a. MONANDRIA.

Monogynia.

CANNA. cor. 6-partita, erecta : labio 2-partito, revolut. Stylus lanceolatus, corollæ adnatus. Calyx 3-phyllus.

1. *Indica* foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis.

BALISIER. *Cannacorus latifolius vulgaris*. T.

SALICORNIA. cal. ventriculosus integer. Petala 0.
sem. 1.

2. *Fruticosa* caule erecto fruticoso.

SALICOR. *Salicornia geniculata semper virens* T.

CLASSIS II^a. DIANDRIA.*Monogynia.*

- J**ASMINUM. cor. 5-fida. bacca dicocca. sem. arillata.
anther intrà tubum.
3. *Officinale*. foliis oppositis, foliolis distinctis. JASMIN.
Jasminum Vulgatus, flore albo T.
- LIGUSTRUM. cor. 4-fida. bacca 4-sperma.
4. *Vulgare*. T. L. TROENE.
- PHILLYREA. cor. 4-fida. bacca 1-sperma.
5. *Angustifolia*. Foliis lineari-lanceolatis integerrimis.
FILARIA. A FEUILLES ÉTROITES. Phill. ligustri
folio. T.
6. *Latifolia*. fol. ovato-cordatis ferratis.
FILARIA A LARGES FEUILLES. Phill. latifol.
spinosa. T.
- OLEA. cor. 4-fida: laciniis subovatis. Drupa 1 sperma.
7. *Europæa* fol. lanceolatis. OLIVIER. Olea sativa T.
- SYRINGA. cor. 4-fida. Capsula bilocularis.
8. *Vulgaris* foliis ovato cordatis. LILAC. Lilac. T.
- CIRCÆA. cor. 2-petala. cal. 2-phyllus superus. sem.
1. biloculare.
9. *Luteana*. L. T. caule erecto, racemis pluribus,
foliis ovatis. CIRCÉE.
- VERONICA. cor. limbo 4-partito: lacinia infimâ
angustiore. Capsula bilocularis.
10. *Officinalis*. Spicis lateralibus pedunculatis, foliis
oppositis, caule procumbente. VERONIQUE. THÉ
D'EUROPE.
Veronica mas supina & vulgatissima T.
11. *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis lanceolatis
ferratis caule erecto. VERONIQUE CRESSONNÉE.
Veronica aquatica major (& minor) folio ro-
tundo T.

12. *Anagallis*. racemis lateralibus , foliis lanceolatis ferratis caule erecto. VERONIQUE A FEUILLES DE MOURON.

Veronica aquatica major (& minor) folio oblongo T.

13. *Teucrium*. racemis lateralibus longissimis , foliis ovatis , rugosis , dentatis , obtusiusculis , caulibus procumbentibus. VERONIQUE DES PRÉS. Veron. supina teucrii folio T.

14. *Chamædris*. racemis lateribus , foliis ovatis , sessilibus , rugosis dentatis , caule bifariam piloso. VERON. A FEUILLES DE GERMANDRÉE. Ver. minor foliis imis rotundioribus. T.

GRATIO LA. cor. irregularis resupinata. Stam. 2 sterilia caps. 2-locularis. cal. 7-phyllus : 2 exterioribus patulis.

15. *Officinalis* fol. lanceolatis ferratis , floribus pendunculatis. GRATIOLE ou HERBE AU PAUVRE HOMME. Digitalis minima gratiola dicta T.

VERBENA. cor. infundibuli formis subæqualis curva. calycis unico dente truncato. sem. 2 f. 4 nuda. Stamina 2 f. 4.

16. *Officinalis*. tetrandra spicis filiformibus paniculatis foliis multifido laciniatis , caule solitario.

VERVEINE. Verbena communis flore cærulæo T.

LYCOPUS. cor. 4-fida. lacinia unica emarginata. Stam. distantia. sem. 4 retusa.

17. *Europæus*. Foliis sinuato ferratis. PIED DE LOUP.

Lycopus palustris glaber (& villosus) T.

ROSMARINUS. cor. inæqualis , labio superiore bipartito. Filamenta longa , curva , simplicia cum dente.

18. *Officinalis*. ROMARIN. Rosm. hortensis angustiore folio T.

SALVIA. cor. inæqualis. Filamenta transverse pedicello affixa.

19. *Officinalis* foliis lanceolato ovatis integris crenulatis floribus spicatis , calycibus acutis. SAUGE. Salvia major. Salvia minor aurita & non aurita T.

20. *Horminum*. Foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis.

ORMIN. horminum comâ purpureo violacea T.

21. *Verbenaca*. Foliis ferratis sinuatis læviusculis, corollis calyce angustioribus.

HERBE AU PRUDHOMME. Horminum sylvestre lavendulæ flore. T.

22. *Sclarea*. Foliis rugosis cordatis oblongis villosis ferratis, bracteis coloratis calyce longioribus concavis acuminatis. ORVALE. TOUTE BONNE. *Sclarea tabern.* T.

23. *Æthiopis*. Foliis oblongis, erosis, lanatis, bracteis recurvatis subspinosis. *Gouan.* *Sclarea vulgaris* lanuginosa amplissimo folio. T.

SAUGE SINUÉE.

CLASSIS III^a. TRIANDRIA.

Monogynia.

VALERIANA. *cal.* o. cor. 1-petala basi hinc gibba supera. sem. 1.

24. *Officinalis*. Floribus triandris foliis omnibus pinnatis. VALERIANE SAUVAGE. *Valeriana sylvestris* major. V. S. M. altera folio lucido. Val. palustris. T.

25. *Phu.* floribus triandris foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis. *Caulis non sulcatus* R. GRANDE VALERIANE. *Valeriana hortensis*. Phu. folio olu-fatri *dioscoridis*. T.

26. *Locusta* Floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Variet.* 8. *Descriptit* R. MACHE BLANCHETTE. *Valerianella arvensis*, præcox, humilis, sem. compresso. T.

TAMARINDUS. *cal.* 4-partitus. *Petala* 3, *nectarium* setis 2 brevioribus sub filamentis. *Legumen* pulposum.

27. *Indica*. TAMARIN. Tamarindus. T.

CNEORUM. *cal.* 3-dentatus *Petala* 3. æqualia bacca
3 - cocca.

28. *Tricoccon*. CAMELÉE. Chamaëlea tricoccos T.

CROCUS. *cor.* 6-partita, æqualis, stigmata convoluta.

29. *Sativus* spatha univalvi radicali, corolla tubo longissimo. SAFRAN. Crocus sativus. T.

GLADIOLUS. *cor.* 6 - partita, ringens. *Stam.* adscendentia.

30. *Communis*. Foliis ensiformibus, floribus distantibus.

GLAYEUL. Gladiolus floribus uno versu dispositis major & procerior. . G. utrinq. floridus. T.

IRIS. *cor.* 6-partita. *Petalis* alternis reflexis. *Stigmata* petaliformia.

31. *Florentina*. corollis barbatis, caule foliis altiore subbifloro, floribus sessilibus. IRIS DE FLORENCE. Iris alba Florentina. i. hortensis alba germanica. T.

32. *Germanica*. Corollis barbatis caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. IRIS D'ALLEMAGNE. FLAMBE. Iris vulgaris germanica five sylvestris. T.

33. *Pseud'Acorus*. corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. IRIS JAUNE. Iris palustris, lutea. T.

34. *Fætidissima*. Corollis imberbibus, petalis interioribus patentissimis, caule uniangulato, foliis ensiformibus. GLAYEUL PUANT. Iris fætidissima seu xyris. T.

35. *Tuberosa*. corollis imberbibus foliis tetragonis. HERMODATTE. Hermodactylus folio quadrangulo T.

CYPERUS. *Glumæ* paleaceæ, distiche imbricatæ.
cor. o. *sem.* i. nudum.

36. *Longus*. culmo triquetro folioso, umbella foliosa supradecomposita, spiculis umbellato sessilibus. SOUCHET. Cyperus odoratus radice longâ, five cyperus officinarum. T.

6 TRIANDRIA MONOGYNIA.

37. *Rotundus* culmo triquetro subnudo umbella decomposita : spicis alternis linearibus. SOUCHET ROND. *Cyperus rotundus vulgaris*. T.

Digynia.

SACCHARUM. *cal.* lanugo longa extra calycem ,
cor. 2-valvis.

38. *Officinarum*. Floribus paniculatis , foliis planis. CANNE A SUCRE. Arundo saccharifera. T.

PHALARIS. *cal.* 2 - valvis , carinatus , longitudine æqualis , corollam includens.

39. *Canariensis*. Panicula subovata spiciformi , glumis carinatis. BLEU DE CANARIE. Gramen spicatum semine miliaceo albo. T.

PANICUM. *Cal.* 3-valvis : valvula tertia minima.

40. *Italicum*. spica composita , spiculis glomeratis setis immixtis pedunculis hirsutis. PANIS CULTIVÉ. p. italicum panicula majore. T.

41. *Dactylon*. spicis digitatis patentibus : basi interiore villosis , floribus solitariis , sarmentis repentibus. CHIENDENT. Gramen dactylon radice repente sive officinarum. T.

42. *Miliaceum* panicula laxa flaccida , foliorum vaginis hirtis , glumis mucronatis , nervosis. MILLET. Miliaceum semine luteo. M. sem. albo. T.

AVENA. *cal.* 2-valvis , multiflorus : arista dorsali contorta.

43. *Sativa*. Paniculata , calycibus dispermis , seminibus lævibus altero aristato. AVOINE CULTIVÉE. Avena nigra. Av. alba. T.

ARUNDO. *cal.* 2-valvis. Flosculi congesti , lana cincti.

44. *Donax* calycibus 5-floris , panicula diffusa , culmo fruticoso. ROSEAU. Arundo sativa , quæ donax dioecoridis. T.

LOLIUM. *cal.* 1-phyllus , fixus , multiflorus.

45. *Perenne*. Spica mutica , spiculis compressis multifloris. IVROIE VIVACE. Gramen loliaceum , angustiore folio & spica. T.

46. *Temulentum* spica aristata, spiculis compressis multifloris. IVROIE DES BLEDS. Gramen loliaceum spica longiore aristas habens. T.
- SECALE. *cal.* oppositus, 2-valvis, 2-florus solitarius.
47. *Cereale* glumarum ciliis scabris. SEIGLE. Secale hybernium vel majus. S. Vernalium vel minus. T.
- HORDEUM. *cal.* lateralis, bivalvis, uniflorus, ternus.
48. *Vulgare.* flosculis omnibus hermaphroditis aristatis: ordinibus duobus erectioribus. ORGE. Hordeum polystichum vernum. T.
49. *Distichon.* Flosculis lateralibus masculis muticis, feminibus angularibus imbricatis. L. T.
- TRITICUM. *cal.* bivalvis, solitarius, subtriflorus. *Flos* obtusiusculus acutus.
50. *Hybernium.* calycibus quadrifloris ventricosis lævibus imbricatis submuticis. FROMENT. TOUZELLE. Triticum hybernium aristis carens. T.
51. *Monococcum* calycibus subtrifloris: primo aristato, intermedio sterili. EPAUTRE. Hordeum distichum, spica nitida, zea seu briza nuncupatum. T.
52. *Repens.* calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. FROMENT RAMPANT. CHIENDENT. Gramen loliaceum radice repente seu gramen officinarum. T.

CLASSIS IV^a. TETRANDRIA.

Monogynia.

- G**LOBULARIA. *cal.* communis imbricatus; proprius tubulatus, inferus. *Corollulæ* labio superiore 2-partito: inferiore tripartito. *Receptaculum* paleaceum.
53. *Alypum* caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque. TURBITH BLANC. SÉNÉ DES

8 TETRANDRIA MONOGYNIA.

PROVENÇAUX. Glob. fruticosa myrti folio tridentato. T.

54. *Vulgaris*. Caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. L. T. GLOBULAIRE.

DIPSACUS. *cal.* communis polyphyllus : proprius superus. *Receptac.* palacem.

55. *Fullonum*. foliis sessilibus ferratis. CHARDON A FOULON. Dipsacus fativus. D. Sylvestris aut virga pastoris major. T.

SCABIOSA. *cal.* communis polyphyllus : proprius duplex superus. *Recept.* paleaceum f. nudum.

56. *Succisa* corollulis 4-fidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. REMORS. MORSURE DU DIABLE. Scabiosa folio integro hirsuto. S. fol. int. glabro. T.

57. *Arvensis* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incis, caule hispido. SCABIEUSE. Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum. T.

GALIUM. *cor.* 1-petala, plana. *sem.* subrotunda.

58. *Verum* foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus. CAILLE LAIT JAUNE. Gallium luteum. T.

59. *Aparine*. foliis octonis lanceolatis, carinis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. GRATTERON. Aparine vulgaris. T.

RUBIA. *cor.* 1-petala, campanulata. *Baccæ* 2. monospermæ.

60. *Tinctorum*. foliis annuis. caule aculeato. GARENCE. Rubia tinctorum fativa. R. sylvestris monspessulana major. T.

PLANTAGO. *cal.* 4-fidus. *cor.* 4 fida : limbo reflexo. *Stam.* longissima. *Capf.* 2-locularis, circumscissa.

61. *Major*. Foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. GRAND PLANTAIN. Plantago latifolia sinuata. T.

62. *Lanceolata* foliis lanceolatis, spica sub-ovata nuda, scapo

TETRANDRIA MONOGYNIA. 9

scapo angulato. PLANTAIN LANCEOLÉ. *Plantago angustifolia* major . . . minor , &c. T.

63. *Coronopi-folia*. Foliis linearibus dentatis , scapo tereti. PLANTAIN CORNE DE CERF. *Coronopus horten-sis*. T.

64. *Psyllium*. caule ramoso herbaceo , foliis subdenta-tis recurvatis capitulis aphyllis. HERBE AUX PU-CES ANNUELLE. *Psyllium majus erectum*. T.

65. *Cynops*. caule ramoso suffruticoso , foliis integerri-mis filiformibus strictis , capitulis subfoliatis. HER-BE AUX PUCES VIVACE. *Psyllium majus supinum*. T.

SANGUISORBA. *cal.* 2 - phyllus. *Germen* inter caly-cem corollamque.

66. *Officinalis*. Spicis ovatis. GRANDE PIMPRENELLE. *Pimpinella sanguisorba* major. T.

CORNUS. *Involucrum* 4-phyllum sæpiùs. *Petala* su-pera 4. *Drupa* nucleo biloculari.

67. *Mascula*. Arborea , umbellis involucrum æquanti-bus. CORNOULLIER MALE. *Cornus horten-sis* (& sylvestris) mas.

68. *Sanguinea*. arborea , cymis nudis , ramis rectis. CORNOUILLER SANGUIN. *Cornus femina*. T.

CAMPHOROSMA. *cal.* urceolatus , dentibus 2 op-positis alternisque minimis. *cor.* nulla. *capsf.* 1-sperma.

69. *Monspeliata*. Foliis hirsutis linearibus. CAMPHRÉE. *Camphorata hirsuta*. T.

ALCHEMILLA. *cal.* 8-fidus. *cor.* 0. *sem.* 1.

70. *Vulgaris*. Foliis lobatis. PIED DE LION. *Alchimilla vulgaris*. al. minor. T.

Digynia.

CUSCUTA. *cal.* 4-fidus. *cor.* 1-petala. *capsf.* 2-locularis.

71. *Europæa*. Floribus sessilibus. CUSCUTE. *Cuscuta* major. C. minor. T.

Tetragynia.

ILEX. *cal.* dentatus. *cor.* rotata. Stylus o. Bacca 4-sperma.

72. *Aquifolium.* foliis ovatis acutis spinosis. HOUX ÉPI-NEUX. *Aquifolium* sive *agrifolium* vulgo. T.

CLASSIS V^a. PENTANDRIA.

Monogynia.

HELIOTROPIUM. *cor.* hypocrateriformis, 5-fida, interjectis dentibus : fauce nuda.

73. *Europæum.* foliis ovatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis conjugatis. HERBE AUX VERRUES. *Heliotropium* majus *dioscoridis*. T.

LITHOSPERMUM. *cor.* infundibuliformis fauce perforata nuda, *cal.* 5-partitus.

74. *Officinale.* feminibus lævibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. GREMIL. HERBE AUX PERLES. *Lith.* majus erectum. T.

75. *Purpureo-cærulæum.* feminibus lævibus, corollis calycem multoties superantibus. GREMIL VIOLET. *Lithops.* minus repens *latifolium*. T.

ANCHUSA. *cor.* infundibuliformis fauce clausa fornicibus. *sem.* basi insculpta.

76. *Officinalis.* Foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. BUGLOSSE. Buglossum angustifolium majus, flore albo... flore rubro aut variegato. Bugl. sylvestre majus nigrum. T.

77. *Tinctoria.* tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. ORGANETTE. Buglossum radice rubra, sive anchusa vulgatio, floribus cærulæis . . . floribus albis. T.

CYNOGLOSSUM. *cor.* infundibulif. fauce clausa fornicibus. *sem.* depressa ; interiore tantum latere stylo affixa.

78. *Officinale.* Staminibus corolla brevioribus , foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. LANGUE DE CHIEN. Cynoglossum majus vulgare. T.

PULMONARIA. *cor.* infundib. fauce pervia. *cal.* prismatico - 5 - gonus.

79. *Officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. PULMONAIRE. Pulm. Italicum ad Buglossum accedens. T.

SYMPHYTUM. corollæ limbus tubulato ventricosus : fauce clausa radiis subulatis.

80. *Officinale.* foliis ovato - lanceolatis decurrentibus. GRANDE CONSOUDE. Symphytum consolida major. T.

81. *Tuberosum.* foliis semidecurrentibus , summis oppositis. CONSOUDE TUBEREUSE. Symph. tuberosa radice majus (& minus.) T.

BORAGO. *cor.* rotata : fauce radiis clausa.

82. *Officinalis* foliis omnibus alternis , calycibus patentibus. BOURRACHE. Borrigo floribus cæruleis (& albis) T.

ECHIUM. *cor.* irregularis , fauce nuda.

83. *Vulgare.* caule tuberculo hispido , foliis caulinis lanceolatis hispidis , floribus spicatis lateralibus. VIPERINE. Echium vulgare. T.

PRIMULA. Involucrum umbellulæ. Corollæ tubus cylindricus : ore patulo.

84. *Veris.* fol. dentatis rugosis. PRIMEVERE. Primula veris odorata flore luteo simplici. T.

85. *Auricula.* foliis serratis glabris. OREILLE D'OURS. Auricula ursi. T.

CYCLAMEN. *cor.* rotata , reflexa , tubo brevissimo : fauce prominente. *Bacca* tecta capsula.

86. *Europæum.* Corolla retroflexa. PAIN DE POURCEAU. Cyclamina fere omnia. T.

MENIANTHES. *cor.* hirsuta. Stigma 2-fidum. *caps.* 1-locularis.

87. *Trifoliata*. foliis ternatis. TREFLE DEAU. Menyanthes palustre latifolium (& angustifolium.) T.

LYSIMACHIA. cor. rotata. caps. globosa , mucronata 10-valvis.

88. *Vulgaris*. paniculata , racemis terminalibus. CORNEILLE. CHASSE BOSSE. Lysim. lutea major. T.

89. *Nummularia*. foliis subcordatis , floribus solitariis , caule repente. HERBE AUX ECUS. Lysim. humifusa folio rotundiore , flore luteo. T.

ANAGALLIS. cor. rotata. capsula circumscissa.

90. *Arvensis*. fol. indivisis , caule procumbente. MOURON. anag. flore phœniceo (& cærulæo.) T.

PLUMBAGO. cor. infundibulif. Stam. squammis basin corollæ cludentibus inserta. stigma 5-fidum sem. 1. oblongum , tunicatum.

91. *Europæa*. fol. amplexicaulibus lanceolatis scabris. DENTELAIRE. Plumbago quorundam. T.

CONVOLVULUS. cor. campanulata plicata. stigmata 2 caps. 2 - locularis , loculis dispersis.

92. *Arvensis*. foliis sagittatis utrinque acutis , pedunculis sub uni-floris. PETIT LISERON. conv. minor arvensis. T.

93. *Sepium*. foliis sagittatis postice truncatis , pedunculis tetragonis unifloris. LISERON DES HAIES. conv. major albus T.

94. *Scammonea*. foliis sagittatis postice truncatis , pedunculis teretibus subtrifloris. SCAMMONÉE. convolv. syriacus & scammonia syriaca. T.

95. *Soldanella*. foliis reniformibus , pedunculis unifloris. CHOU MARIN. Conv. maritim. nostras rotundifol. T.

CAMPANULA. cor. campanulata , fundo clauso valvis staminiferis. stigma 3-fidum. caps. infera poris lateralibus dehiscens.

96. *Rapunculus*. foliis undulatis ; radicalibus lanceolato ovalibus , panicula coarctata. RAIPONCE. camp. radice esculenta , flore cærulæo (& candicante.) T.

97. *Trachelium*. caule angulato , foliis petiolatis , calycibus ciliatis , pedunculis trifidis. CAMPANULLE GANTELÉE. camp. vulgatioꝝ fol. urticae , vel major & asperior , flore candido.
- PHYTEUMA. cor. rotata laciniis linearibus , 5-partita. *Stigma* 2. f. 3-fidum *caps.* 2. f. 3-locularis infera.
98. *Spicata*. Spica oblonga , capsulis bilocularibus , foliis radicalibus cordatis. RAIPONCE EN ÉPI. Rapunculus spicatus. T.
- SAMOLUS. cor. hypocrateriformis. *Stam.* munita squamulis corollae. *caps.* 1-locularis , infera.
99. *Valerandi*. L. T. MOURON D'EAU.
- LONICERA. cor. 1-petala , irregularis. *bacca* polysperma 2-locularis , infera.
100. *Caprifolium*. Floribus verticillatis terminalibus sessilibus , foliis summis connato-perfoliatis. CHEVREFEUILLE DES JARDINS. caprifol. italicum. T.
101. *Periclymenum*. capitulis ovatis imbricatis terminalibus , foliis omnibus distinctis. CHEVREFEUILLE DES BOIS. Caprifol. germanicum. T.
- MIRABILIS. cor. infundib. supera. *cal.* inferus. *Nectarium* globosum , germen includens.
102. *Dichotoma*. Floribus sessilibus axillaribus erectis solitariis. BELLE DE NUIT. Jalappa parvo flore. T.
103. *Jalappa*. Floribus congestis terminalibus erectis. JALAP. Jalappa flore purpureo & seq. T.
- CORIS. cor. 1-petala , irregularis , *calyx* spinosus. *caps.* 5-valvis supera.
104. *Monspeliensis*. Coris caerulea maritima. T. CORIS. VERBASCUM. cor. rotata , subinaequalis , *caps.* 2-locularis 2-valvis.
105. *Thapsus*. foliis decurrentibus utrinque tomentosis caule simplici. BOUILLON BLANC. Verbascum mas latifolium luteum. T.
106. *Nigrum*. Foliis cordato oblongis petiolatis. BOUILLON NOIR. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente. T.

34 PENTANDRIA MONOGYNIA.

107. *Blattaria*. Foliis amplexicaulibus oblongis glabris , pedunculis solitariis. HERBE AUX MITTES. *Blattaria* lutea folio longo laciniato. T.

DATURA. *cor.* infubul. plicata. *cal.* tubulosus , angulatus , deciduus. *capsf.* 4-valvis.

108. *Ferox*. Pericarpis spinosis erectis ovatis : spinis summis maximis convergentibus. POMME ÉPINEUSE DU PEROU. *Stramonium ferox*. T.

109. *Stramonium*. pericarpis spinosis erectis ovatis , foliis ovatis glabris. ENDORMIE. POMME ÉPINEUSE. *Stramonium* fructu spinoso oblongo , flore albo. T.

110. *Metel.* Pericarpis spinosis nutantibus globosis foliis cordatis sub integris pubescentibus. ENDORMIE A FEUILLES ENTIÈRES. *Stramonium* fructu spinoso , rotundo , flore albo , simplici. T.

HYOSCIAMUS. *cor.* infundibulif. obtusa. *Stam.* inclinata. *capsf.* operculata , 2-locularis.

111. *Niger*. Foliis amplexicaulibus sinuatis , floribus sessilibus. JUSQUIAME. HANNEBANE. *Hyoscyamus vulgaris* , vel *niger*. T.

112. *Albus*. Foliis petiolatis sinuatis obtusis , floribus sessilibus. JUSQUIAME BLANCHE. *Hyosc.* albus major & minor. T.

NICOTIANA. *cor.* infundibul. limbo plicato. *stam.* inclinata. *capsf.* 2-valvis 2-locularis.

113. *Tabacum*. Foliis lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus , floribus acutis , caule frutescente. TABAC. PÉTUN. NICOTIANE. *Nicotiana* major latifolia. T.

114. *Rustica*. Foliis petiolatis ovatis integerrimis , floribus obtusis. PRIAPÉE. HERBE A LA REINE. *Nicotiana* minor. T.

115. *Glutinosa*. Foliis petiolatis cordatis integerrimis , floribus racemosis secundis subringentibus. NICOTIANE GLUANTE.

ATROPA. *cor.* campanulata. *stam.* distantia. *bacca* globosa 2-locularis.

116. *Mandragora*. acaulis, scapis unifloris. MANDRAGORE MALE. Mandr. fructu rotundo. T.

117. *Belladonna*. caule herbaceo, foliis ovatis integris. BELLADONE. Belladonna majoribus foliis & floribus. T.

PHYSALIS. cor. rotata. *stam.* conniventia. *bacca* intra calycem inflatum, bilocularis.

118. *Alkekengi*. Foliis geminis integris acutis, caule herbaceo interne subramoso. COQUERET. Alkekengi officinarum. T.

SOLANUM. cor. rotata. *antheræ* sub coalitæ apice poro gemino dehiscentes. *bacca* 2-ocularis.

119. *Dulcamara*. caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. MORELLE GRIMPANTE. DOUCE. AMERE. Solanum scandens, seu dulcamara. T.

120. *Tuberosum*. caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis subdivisis. POMME DE TERRE. BATTATE DE VIRGINIE. Solanum tuberosum esculentum. T.

121. *Lycopersicum*. caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisfis, racemis simplicibus. POMME D'AMOUR. Lycopersicon galeni. T.

122. *Nigrum*. caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato angulatis, racemis distichis nutantibus. MORELLE A FRUIT NOIR. Solanum officinarum acinis nigricantibus. T.

123. *Melongena*. caule inermi herbaceo, foliis ovatis tomentosis, pedunculis pendulis incrassatis, calycibus inermibus. MAYENNE. AUBERGINE. Melongena fructu oblongo violaceo, &c.

CAPSICUM. cor. rotata. *bacca*. exsucca.

124. *Annum*. caule herbaceo, pedunculis solitariis. PIMENT. CORAIL DES JARDINS. Capsicum filiquis longis, propendentibus. T.

RHAMNUS. cal. tubulosus: squamis stamina munientibus. cor. nulla. *bacca*.

125. *Catharticus*. Spinis terminalibus, floribus quadri-

16 PENTANDRIA MONOGYNIA.

fidis dioicis , foliis ovatis. NERPRUN. BOURGEPI-
NE. Rhamnus catharticus. T.

126. *Frangula*. inermis , floribus monogynis herma-
phroditis , foliis integerrimis. AULNE NOIR. BOUR-
GENE. Frangula. T.

127. *Alaternus*. inermis , floribus dioicis , stigmate tri-
plici , foliis ferratis. ALATERNE. Alaternus. T.

128. *Paliurus*. aculeis geminatis : inferiore reflexo ,
floribus trigynis. PALIURE. Paliurus. T.

129. *Zizyphus*. aculeis geminatis : alterno recurvo ,
floribus digynis , foliis ovato-oblongis. JUJUBIER.
Zizyphus. T.

EVONYMUS. cor. 5-petala. caps. 5-gona , 5-locula-
ris , 5-valvis , colorata. sem. calyptrata.

130. *Europæus*. floribus plerisque quadrifidis , foliis
sessilibus. FUSAIN. BONNET DE PRETRE. Evony-
mus vulgaris granis rubentibus. T.

RIBES. Petala 5. & stamina calyci inserta. Stylus 2-
fidus. bacca polysperma infera.

131. *Rubrum*. inerme , racemis glabris pendulis , flori-
bus planiusculis. GROSEILLER A FRUIT ROUGE.
Grossularia multiplici acino , sive non spinosa ,
hortensis rubra sive ribes officinarum. T.

132. *Nigrum*. inerme , racemis pilosis , floribus oblon-
gis. CASSIS. Grossularia non spinosa , fructu nigro
majore. T.

133. *Uva crispa*. ramis aculeatis , baccis glabris , pedi-
cellis bractea monophillâ. GROSEILLER ÉPINEUX.
Grossularia simplici acino vel spinosa , sylvestris. T.

HEDERA. petala 5 , oblonga. bacca 5-sperma , ca-
lyce cincta.

134. *Helix*. Foliis ovatis lobatisque. LIERRE. Hedera
arborea. T.

VITIS. Petala apice cohærentia , emarcida. Bacca 5-
sperma , supera.

235. *Vinifera*. foliis lobatis sinuatis nudis. VIGNE. Vitis
vinifera. T.

136. *Labrusca*. foliis cordatis subtrilobis dentatis subtus
tomentosis.

tomentosus. *VIGNE SAUVAGE*. *Vitis sylvestris labrusca*. T.

ILLECEBRUM. *cal.* 5-phyllus, cartilagineus. *cor.* o. *stigma* simplex. *caps.* 5-valvis monosperma.

137. *Paronychia*. Floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus procumbentibus, foliis lævibus. *HERBE AUX PANARIS*. *Paronychia hispanica*. T.

VINCA. contorta. *folliculi* 2 erecti. *sem.* nuda.

138. *Minor*. caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *PETITE PERUVENCHE*. *Pervinca vulgaris angustifolia*. T.

139. *Major*. caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pedunculatis. *GRANDE PERUVENCHE*. *Pervinca vulgaris latifolia* flore cærulæo. T.

NERIUM. contorta, *folliculi* 2, erecti. *sem.* plumosa. *cor.* tubus terminatus corona lacera.

140. *Oleander*. foliis lineari lanceolatis ternis, corollis coronatis. *LAURIER ROSE*. *Nerion* floribus rubescentibus. T.

Digynia.

CYNANCHUM. contorta. Nectarium cylindricum, 5-dentatum.

141. *Monspelianum*. caule volubili herbaceo, foliis reniformi cordatis acutis. *SCAMONÉE DE MONTPELLIER*. *Periploca Monspeliaca*, foliis rotundioribus. T.

ASCLEPIAS. Contorta. *Nect.* 5, ovata concava, corniculum exerentia.

142. *Vincetoxicum*. foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *DOMPTE VENIN*. *Asclepias albo flore*. T.

HERNIARIA. *cal.* 5-partitus. *cor.* o. *stam.* 5, sterilia. *caps.* 1-sperma.

143. *Glabra*. *Glabra* glomerulis multifloris. *TURQUETTE LISSE*. *Herniaria glabra*. T.

144. *Hirsuta*. *Hirsuta*, glomerulis paucifloris. *TUR-*

QUETTE VELUE. Herniaria hirsuta. T.

CHENOPODIUM. *cal.* 5-phyllus, 5-gonus. *cor.* o. *sem.* 1 lenticulare, superum.

145. *Bonus henricus.* foliis triangulari sagittatis integerrimis, spicis compositis aphillis axillaribus. *BON HENRI.* Chenopodium folio triangulato. T.

146. *Botrys.* foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *BOTRIS.* Chenopod. ambrosioides folio sinuato. T.

147. *Ambrosioides.* foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. *THÉ DU MEXIQUE.* Chenop. ambrosioid. Mexicanum. T.

148. *Vulvaria.* foliis integerrimis rhombeo ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *ARROCHE PUANTE.* Chenopodium foetidum. T.

BETA. *cal.* 5-phyllus. *cor.* o. *sem.* reniforme, intra substantiam baseos calycis.

149. *Vulgaris.* Floribus congestis. *POIRÉE. BETTE.* Beta rubra vulgaris. T.

SALSOLA. *cal.* 5-phyllus. *cor.* o. *capsf.* 1-sperma. *sem.* cochleatum.

150. *Kali.* herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus. *KALI.* Kali spinosum foliis crassioribus & brevioribus. T.

151. *Soda.* herbacea patula, foliis inermibus. *SOUDE.* Kali majus, cochleato semine.

ULMUS. *cal.* 5-fidus. *cor.* o. Bacca exsucca, compresso membranacea.

152. *Campestris.* Foliis duplicato-ferratis: basi inæqualibus. *ORMEAU. ORME.* Ulinus campestris & theophrasti. T.

GENTIANA. *cor.* 1-petala. *capsf.* 2-valvis, 1-ocularis receptaculis 2 longitudinalibus.

153. *Lutea.* corollis sub quinque fidis rotatis verticillatis calycibus spathaceis. *GRANDE GENTIANE.* Gentiana major lutea. T.

154. *Centaurium.* corollis 5-fidis infundibuliform. caule dichotomo, pistillo simplici. *PETITE CENTAU-*

RÉE. *Centaurium minus. id. flore albo. T.*

155. *cruciata. Corollis quadrifidis imberbibus, floribus verticillatis sessilibus. GENTIANE CROISSETTE. Gentiana cruciata. T.*

Umbellatæ.

ERYNGIUM. *Flores capitati. receptaculo paleaceo.*

156. *Maritimum. Foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis paleis tricuspidatis. PANICAUT MARIN. Eryngium maritimum. T.*

157. *Campestre. Foliis radicalibus amplexicaulibus pinato lanceolatis. CHARDON ROLLAND ou A CENTETES. PANICAUT. Eryngium vulgare. T.*

SANICULA. *Umbellæ confertæ, subcapitatae. Fructus scaber. Flores disci abortientes.*

158. *Europæa. Foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. SANICLE. Sanicula officinarum. T.*

ASTRANTIA. *involucra partialia lanceolata, patentia, æqualia, longiora, colorata. Flores plurimi abortientes.*

159. *Major. Foliis 5-lobis: lobis 3-fidis. SANICLE FEMELLE. Astrantia major coronâ floris purpurascente candidâ. T.*

BUPLEVRUM. *Involucra umbellulæ majora, 5-phylla. Petala involuta. Fructus subrotundus, compressus striatus.*

160. *Rotundifolium. involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. PERCE FEUILLE. Buplevrum perfoliatum rotundifolium annuum. T.*

TORDYLIUM. *cor. radiatæ, omnes hermaphroditæ. Fructus suborbiculatus, margine crenatus. Involucra, longa, indivisa.*

161. *Officinale. involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. SESELI DE CRETE. Tordylium Narbonense minus. T.*

DAUCUS. *cor.* subradiatæ. *flosculi* disci abortivi. Fructus pilis hispidus.

162. *Carota*. Seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. CAROTTE. Daucus vulgaris . . . sativus. T.

163. *Visnaga*. Seminibus lævibus, umbella universalibasi coalita. VISNAGUE. Fœniculum annuum umbella contractâ oblongâ. T.

AMMI. involucria pinnatifida. *corollæ* radiatæ : omnes hermaphroditæ. *Fructus* lævis.

164. *Majus*. foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, superioribus multifidis linearibus. AMMI. Ammi majus. T.

BUNIAM. *cor.* uniformis. Umbella conferta. Fructus ovati.

165. *Bulbocastanum*. involucrio polyphylo. TERRE NOIX. Bulbocastanum majus folio apii. T.

CONIUM. involucria dimidiata, subtriphylla. Fructus subglobosus 5-striatus, utriusque crenatus.

166. *Maculatum*. seminibus striatis. GRANDE CIGUE. Cicutamajor. T.

ATHAMANTA. *Fructus* ovato oblongus, striatus. *Petalata* inflexa emarginata.

167. *Libanotis*. foliis bipinnatis planis, umbella hemisphærica, seminibus hirsutis. ATHAMANTE DE MONTAGNE. Apium petræum montanum album
Bauhin. hist. Libanotis apii folio minor. C. *Bauhin. pinax.*

168. *Cretensis*. foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis. ATHAMANTE DE CRETE. Myrrhis annua, semine striato, villosa, incana. T.

PEUCEDANUM. *Fructus* ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. *Involucria* brevissima.

169. *Officinale*. foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. QUEUE DE POURCEAU. Peucedanum germanicum. T.

170. *Silaus*. foliolis pinnatifidis : laciniis oppositis, involucrio universalibiphylo. SAXIFRAGE DES AN-

GLOIS. *Angelica pratensis* apii folio. T.

CRITHMUM. *Fructus* ovalis , compressus. *Flosculi* æquales.

171. *Maritimum*. foliis lanceolatis carnosiss. FENOUIL DE MER. Crithmum sive fœniculum maritimum minus. T.

FERULA. *Fructus* ovalis , compresso-planus , striis utrinque tribus.

172. *Communis*. foliolis linearibus longissimis. FERULE. Ferula fœmina plinii. T.

LASERPITIUM. *Fructus* oblongus : angulis membranaceis. *pet.* inflexa , emarginata , patentia.

173. *Gallicum*. L. T. foliis cuneiformibus furcatis. LASER.

174. *Siler*. foliolis ovali-lanceolatis , integerrimis petiolatis. SESELI DE MONTAGNE. Ligusticum quod seseli officinarum . : ligust. s. filer. montan. angustif. T.

HERACLEUM. *Fructus* ellipticus , emarginatus , compressus , striatus marginatus. *Cor.* difformis inflexo emarginata. *Involucrum* caducum.

175. *Sphondylium*. foliolis pinnatifidis lævibus , floribus uniformibus. BERCE. FAUSSE BRANC-URSINE. Sphondylium vulgare , hirsutum. T.

LIGUSTICUM. *Fructus* oblongus , 5-fulcatus utrinque. *Corollæ* æquales. *Petalis* involutis integris.

176. *Levisticum*. Foliis multiplicibus : foliolis superne incisis. LEVECHE. ACHÉ DE MONTAGNE. Angelica montana , pereunis , paludapii folio T.

ANGELICA. *Fructus* subrotundus , angulatus , foliatus , stylis reflexis. *Corollæ* æquales : petalis incurvis.

177. *Archangelica*. foliorum impari lobato. ANGELIQUE. Imperatoria fativa. T.

178. *Sylvestris*. foliolis æqualibus , ovato-lanceolatis

ferratis. ANGELIQUE DES PRÉS. *Imperatoria pratensis* major. T.

SIUM. Fructus subovatus, striatus. *Involucrum* polyphyllum. *Petala* cordata.

179. *Angustifolium*. foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucrio universali pinnatifido. BERLE A FEUILLES ÉTROITES. Sium sive apium palustre foliis oblongis. T.

180. *Nodiflorum*. foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. BERLE A FLEURS SESSILES. Sium aquaticum ad alas floridum. T.

181. *Sisarum*. foliis pinnatis : floralibus ternatis. CHERVI. Sisarum germanorum. T.

SISON. Fructus ovatus, striatus. *involucra* sub 4-phylla.

182. *Amomum*. foliis pinnatis, umbellis erectis. AMOME. Sium aromaticum, sison officinarum. T.

183. *Ammi*. foliis tripinnatis : radicalibus linearibus ; caulinis setaceis : stipularibus longioribus. *Gouan*. SISON AROMATIQUE. Fœniculum annuum origani odore. T.

BUBON. Fructus ovatus, striatus, villosus.

184. *Macedonicum*. foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numerosissimis. PERSIL DE MACEDOINE. Apium macedonicum. T.

185. *Galbanum*. foliolis rhombeis dentatis glabris striatis, paucis. GALBANUM. Ferula galbanifera. T.

CUMINUM. Fructus ovatus, striatus. *Umbellulæ* 4 : *involucra* 4-fida.

186. *Cuminum*. CUMIN. Fœniculum orientale, cuminum dictum. T.

ÆNANTHE. *Flosculi* diffformes : in disco sessiles, steriles. Fructus calyce & pistillo coronatus.

187. *Crocata*. foliis omnibus multifidis obtusis sub æqualibus. ÆNANTHE VIREUSE. Ænanthe chærophylli foliis. T.

188. *Pimpinelloides*. Foliolis radicalibus cuneatis fissis ; caulinis integris linearibus longissimis, simplicibus.

FILIPENDULE AQUATIQUE. *Oenanthe apii* folio.

T.

PHELLANDRIUM. *Flosculi* disci minores. *Fructus* ovatus, lævis, coronatus perianthio & pistillo.

189. *Aquaticum*. foliorum ramificationibus divaricatis. CIGUE D'EAU. Phellandrium. T.

ÆTHUSA. *Involucella* dimidiata, 3-phylla, pendula. *Fructus* striatus.

190. *Cynapium*. foliis conformibus. PETITE CIGUE. *Cicuta minor petroselino* similis. T.

191. *Meum*. foliis omnibus multipartito setaceis. MEUM. *Meum* foliis anethi. T.

CORIANDRUM. *cor.* radiata. *pet.* inflexo-emarginata. *Involucrum* universale 1-phyllum : partialia dimidiata. *fructus* sphericus.

192. *Sativum*. fructibus globosis. CORIANDRE. Coriandrum majus. T.

SCANDIX. *cor.* radiata. *fructus* subulatus. *petala* emarginata. *Flosculi* disci sæpius masculi.

193. *Odorata*. feminibus fulcatis odoratis. CERFEUIL MUSQUÉ. Myrrhis major, vel cicutaria odorata. T.

194. *Cerefolium*. feminibus nitidis ovato-subulatis umbellulis sessilibus lateralibus. CERFEUIL. Chærophyllum sativum. T.

CHÆROPHYLLUM. *Involucrum* reflexum concavum. *petala* inflexo-cordata, *fructus* oblongus lævis.

195. *Sylvestre*. caule striato geniculis tumidiusculis. CERFEUIL SAUVAGE. Chæroph. sylvestre perenne cicutæ folio. T.

196. *Temulum*. caule scabro : geniculis tumidis. CERFEUIL TACHETTÉ. Myrrhis annua, semine striato, lævi. T.

IMPERATORIA. *Fructus* subrotundus, compressus, medio gibbus, margine cinctus. *petala* inflexo-emarginata.

197. *Ostruthium*. IMPERATOIRE. BENJOIN FRANÇAIS. *Imperatoria* major. T.

SESELI. *Umbellæ* globosæ. *involucr.* folio uno alterove. *Fructus* ovatus, striatus.

198. *Tortuosum.* caule alto rigido, foliolis linearibus fasciculatis. SESELI DE MARSEILLE. Fœniculum tortuosum. T.

THAPSIA. *Fructus* oblongus, membrana cinctus.

199. *Villosa.* foliolis dentatis villosis basi coadunatis. THAPSIE. MALHÉRBE. TURBITH. Thapsia latifolia villosa. T.

PASTINACA. *Fructus* ellipticus, compresso-planus. *petala* involuta, integra.

200. *Sativa.* foliis simpliciter pinnatis. PANAIS CULTIVÉ. Pastinaca sylvestris. . . . Sativa latifolia. T.

201. *Opopanax.* foliis pinnatis: foliolis basi antica excisis. PANAIS ÉLEVÉ. Pastinaca sylvestris altissima. T.

SMYRNIUM. *Fructus* oblongus, striatus. *petala* acuminata, carinata.

202. *Olusatrum.* foliis caulinis ternatis petiolatis serratis. MACERON. Smyrniium mathioli. T.

ANETHUM. *Fructus* subovatus, compressus, striatus. *petala* involuta, integra.

203. *Graveolens.* fructibus compressis. ANET. Anethum hortenfe. T.

204. *Fœniculum.* fructibus ovatis. FENOUIL. Fœniculum vulgare germanicum. Fœnic. dulce. T.

CARUM. *Fructus* ovato-oblongus, striatus. *involucrum* 1-phyllum. *petala* carinata, inflexo-emarginata.

205. *Carvi.* L. T. CARVI.

PIMPINELLA. *Fructus* ovato-oblongus. *petala* inflexa. *stigmata* subglobosa.

206. *Saxifraga.* foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus. PETIT BOUCAGE. Tragoselinum alterum majus . . . minus. T.

207. *Anisum.* foliis radicalibus trifidis incis. ANIS. Apium anisum dictum semine suaveolente majori minori. T.

APIUM. *Fructus* ovatus, striatus. *involucrum* 1-phyl-
lum. *petala* æqualia.

208. *Petroselinum*. *Foliolis* caulinis linearibus, involu-
cellis minutis. PERSIL. Apium hortense seu petro-
selinum vulgo. T.

209. *Graveolens*. *Foliis* caulinis cuneiformibus. CELERI.
Apium palustre & apium officinarum. . apium
dulce, celeri italorum. T.

ÆGOPODIUM. *Fructus* ovato-oblongus, striatus.

210. *Podagraria*. *foliis* caulinis summis ternatis. HERBE
À GERARD. Angelica sylvestris minor sive erratica. T.

Trigynia.

RHUS. *cal.* 5-partitus. *petala* 5. *bacca* 1-sperma.

211. *Coriaria*. *foliis* pinnatis obtusiuscule serratis ovali-
bus subtus villosis. SUMAC. Rhus folio ulmi. T.

212. *Toxicodendron*. *foliis* ternatis : *foliolis* petiolatis
angulatis pubescentibus, caule radicante. LIER-
RE VENENEUX DU CANADA. Toxicodendron tri-
phyllon folio sinuato pubescente. T.

VIBURNUM. *cal.* 5-partitus superus. *cor.* 5-fida. *bacca*
1-sperma.

213. *Lantana*. *foliis* cordatis serratis venosis, subtus to-
mentosis. VIORNE. Viburnum vulgo. T.

214. *Opulus*. *foliis* lobatis, *petiolis* glandulosis. OBIER.
ROSE DE GUELDTRE. BOULE DE NEIGE. Opulus,
T.

SAMBUCUS. *cal.* 5-partitus. *cor.* 5-fida. *bacca* 3-sperma.

215. *Ebulus*. *cymis* tripartitis, *stipulis* foliaceis, caule
herbaceo. YEBLE. Samb. humilis. s. ebulus. T.

216. *Nigra*. *cymis* 5-partitis, caule arboreo. SUREAU.
Sambucus fructu in umbellâ nigro. T.

217. *Racemosa*. *Racemis* compositis, ovatis, caule ar-
boreo. SUREAU À GRAPPE. Samb. racemosa ru-
bra. T.

TAMARIX. *cal.* 5-partitus. *pet.* 5. *caps.* 1-ocularis,
3-valvis. *sem.* papposa.

26 PENTANDRIA TRIGYNIA.

218. *Gallica*. floribus pentandris. TAMARIS. Tamariscus Narbonensis. T.

ALSINE. *cal.* 5-phyllus. *petala* 5 æqualia. *capsf.* 1-locularis, 3-valvis.

219. *Media*. Petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. MORGELINE. L. T.

Pentagynia.

STATICE. *cal.* 1-phyllus, integer, plicatus, scariosus. *petala* 5 *sem.* 1. superum.

220. *Limonium*. scapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis, subtus mucronatis. BEHEN ROUGE. *Limonium maritimum majus*. T.

LINUM. *cal.* 5-phyllus. *petala* 5-*capsf.* 5-valvis, 10-locularis. *sem.* solitaria.

221. *Usitatissimum*. calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. LIN. *Linum arvense . . . sativum*. T.

222. *Catharticum*. foliis oppositis, ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. LIN PURGATIF. *Linum pratense flosculis exiguis*. T.

DROSERA. *cal.* 5-fidus. *pet.* 5. *capsf.* 1-locularis: apice 5-valvis. *sem.* plurima.

223. *Rotundifolia*. Scapis radicatis, foliis orbiculatis. ROSSOLI A FEUILLES RONDES. *Rosfolis folio rotundo*. T.

CLASSIS VI^a. HEXANDRIA.

Monogynia.

NARCISSUS. *petala* 6 æqualia: nectario infundibuliformi 1-phylo. *stam.* intrà nectarium.

224. *Pseudo-Narcissus*. Spatha uniflora, nectario cam-

panulato erecto crispo, æquante petala ovata. NARCISSE SAUVAGE. Narciss. sylvestris, pallidus, calyce luteo. T.

PANCRATIUM. Petala 6: nectario 12-fido. *stam.* nectario imposita.

225. *Maritimum*. Spatha multiflora, petalis planis, foliis lingulatis. NARCISSE DE MER. Narcissus maritimus. T.

ALLIUM. *cor.* 6 partita, patens. Spatha multiflora. Umbella congesta. *capsf.* supera.

226. *Porrum*. caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis, radice tunicata. PORREAU. Porrum commune capitatum . . p. sativum latifol. T.

227. *Victorialis*. caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, staminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. AIL TACHETÉ DES MONTAGNES. Allium montanum latifolium maculatum. T.

228. *Sativum*. caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspidatis. AIL. L. T.

229. *Scorodoprasum*. caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, staminibus tricuspidatis. ROCAMBOLE. Allium sativum, alterum, sive allioprasum caulis summo circumvoluto. T.

230. *Ascalonicum*. scapo nudo tereti, foliis subulatis, umbella globosa, staminibus tricuspidatis. ECHALOTE. Cepa ascalonica. T.

231. *Cepa*. Scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus. OIGNON. Cepa vulgaris. T.

232. *Fistulosum*. Scapo nudo adæquante folia teretia ventricosa. CIBOULE. Cepa oblonga. T.

LILIUM. *cor.* 6-petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera. *capsf.* valvulis pilo cancellato connexis.

133. *Candidum*. foliis sparsis, corollis campanulatis; intus glabris. LYS. Lilium album vulgare. T.

234. *Martagon*. foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. LYS MARTAGON. Lilium floribus

28 HEXANDRIA MONOGYNIA.

reflexis, montanum, flore rubente. & 6. *seq.* T.

FRITILLARIA. *cor.* 6-petala, campanulata, supra
ungues cavitare nectarifera. *flam.* lon-
gitudine corollæ.

235. *Imperialis.* Racemo comoso inferne nudo, foliis
integerrimis. COURONNE IMPÉRIALE. Corona im-
perialis. T.

TULIPA. *cor.* 6-petala, campanulata. *stylus* nullus.

236. *Gesneriana.* flore erecto, foliis ovato-lanceolatis.

TULIPE DES JARDINIERS. Tulipa & *variet.* T.

SCILLA. *cor.* 6-petala, patens, decidua. *Filamenta*
filiformia.

237. *Maritima.* nudiflora, bracteis refractis SCILLE.
Ornithogalum maritim. seu scilla radice rubrâ . .
radice albâ. T.

ASPHODELUS. *cor.* 6-partita. *Nectarium* ex valvulis
sex germen tegentibus.

238. *Ramosus.* caule nudo, foliis ensiformibus carina-
tis lævibus. ASPHODELE RAMEUX. Asphodelus al-
bus ramosus, mas albus non ramosus. T.

ASPARAGUS. *cor.* 6-partita, erecta: petalis tribus
interioribus apice reflexis. *bacca* 3-locu-
laris, 2-sperma.

239. *Officinalis.* caule herbaceo tereti erecto, foliis fe-
taceis, stipulis paribus. ASPERGE. Asparagus sa-
tiva. A. sylvestris tenuissimo folio. A. maritimus
crassiore folio. T.

240. *Acutifolius.* caule inermi angulato fruticoso, fo-
liis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis
æqualibus. ASPERGE PIQUANTE. Asp. foliis acu-
tis. T.

CONVALLARIA. *cor.* 6-fida. *bacca* maculosa, 3-locu-
laris.

241. *Maiatis.* scapo nudo. MUGUET DES VALLÉES. Li-
lium convallium album . . . latifolium. T.

242. *Polygonatum.* foliis alternis amplexicaulibus, cau-
le ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris.
SEAU DE SALOMON. Polygonatum latifol. vulgare.

p. latifolium, flore majore, odore. p. lat. minus flore majore. T.

HYACINTHUS. cor. campanulata : pori 3 melliferi germinis.

243. *Muscari*. corollis ovatis omnibus æqualibus. HYACINTHE MUSQUÉ Muscari moschatum griseo obsoleto flore. m. obsoletiore flore. T.

ALOE. cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero. Filamenta receptaculo inserta.

244. *Perfoliata*. Floribus corymbosis cernuis subcylindricis. *Vera. decima sexta & ultima varietas* foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. ALOËS SUCCOTRIN. Aloë vulgaris. T.

HEMEROCALLIS. cor. campanulata : tubo cylindrico stamina declinata.

245. *Flava*. corollis flavis. LYS ASPHODELE JAUNE. Lilio asphodelus luteus . . . luteus minor. T.

246. *Fulva*. corollis fulvis. LYS ASPHODELE ROUGE. Lilio asphodelus phæniceus. T.

ACORUS. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis. cor. 6-petalæ, undæ, stylus o. caps. 3-locularis.

247. *Calamus*. JONC ODORANT. Acorns verus s. calamus aromaticus officinarum. *Bauhin pinax*.

JUNCUS. cal. 6-phyllus. cor. o. caps. 1-locularis.

248. *Acutus*. culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucrio diphylo spinoso. JONC. Juncus acutus capitulis forghi. T.

BERBERIS. cal. 6-phyllus. pet. 6 : ad ungues glandulis 2. Stylus o. Bacca 2-sperma.

249. *Vulgaris*. pedunculis racemosis. ÉPINE VINETTE. Berberis dumetorum. T.

Digynia.

ORYZA. cal. gluma 2-valvis, 1-flora. cor. 2-valvis, subæqualis, semini adnascens,

250. *Sativa*. L. T. RIS.

Trigynia.

RUMEX. *cal.* 3-phyllus: *petala* 3 conniventia. *sem.* 1 triquetrum.

251. *Patientia*. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis; unica granifera: foliis ovato-lanceolatis. PATIENCE. RHUBARBE DES MOINES. *Lapathum hortense*, folio oblongo, sive secundum *dioscoridis*. l. hort. latifolium. T.

252. *Sanguineus*. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. SANG DRAGON. PATIENCE ROUGE. *Lapathum* folio acuto rubente. T.

253. *Acutus*. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. PATIENCE SAUVAGE. *Lapathum* folio acuto, plano. T.

254. *Aquaticus*. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis. Foliis cordatis glabris acutis. PARELLE. PATIENCE DES MARAIS. *Lapathum aquaticum* folio cubitali. T.

255. *Scutatus*. floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis caule tereti. OZEILLE OREILLÉE. *Acetosa scutata* repens. a. rotundifolia hortensis. T.

256. *Acetosa*. floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. OZEILLE. *Acetosa pratensis*. a. p. flore albo. a. montana maxima. T.

257. *Acetofella*. floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. OZEILLE LANCEOCÉE. *Acetosa arvensis* lanceolata. a. lanceolata angustifolia repens. a. arv. minima non lanceolata. T.

COLCHICUM. *Spatha*. cor. 6-partita: tubo radicato. *capsulæ* 3. connexæ, inflatæ.

258. *Autumnale*. foliis planis lanceolatis erectis. COLCHIQUE. TUE CHIEN. Colchic. commune. T.

Polyginia.

ALISMA. *cal.* 3-phyllus. *petala* 3. *semina* plura.

259. *Plantago*. foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. PLANTAIN D'EAU. Ranunculus palustris plantaginis folio ampliore. T.

260. *Damajonium*. foliis cordato-oblongis, floribus hexaginis, capsulis subulatis. FLUTEAU ÉTOILÉ.

 CLASSIS VII^a. HEPTANDRIA.

Monogynia.

ÆSCULUS. *cal.* 1-phyllus, 5-dentatus, ventricosus. *cor.* 5-petala, inæqualiter colorata, calyci inserta. *caps.* 3-locularis.

261. *Hippocastanum*. floribus heptandris. MARRONNIER D'INDE. hippo-castanum vulgare. T.

 CLASSIS VIII^a. OCTANDRIA.

Monogynia.

TROPÆOLUM. *cal.* 1-phyllus, calcaratus. *petala* 5, inæqualia. *Baccæ* 3, siccæ.

262. *Majus*. foliis peltatis sub quinque-lobis, petalis obtusis. CAPUCINE. Cardaminum ampliori folio & majori flore. T.

EPILOBIUM. *cal.* 4 fidus, *petala* 4. *caps.* oblonga infera. *semina* papposa.

263. *Angustifolium*. foliis sparsis lineari lanceolatis, floribus inæqualibus. HERBE DE-ST. ANTOINE. NERIETTE A ÉPI. Chamænerion latifolium, vul-

gare. ch. lat. vul. flore albo . . ch. lat. alpinum . .
 ch. angustifol. alpin. fl. purpureo . . . flore albo . .
 flore variegato. T.

VACCINIUM. *cal.* superus. *cor.* 1-petala. *filamenta* receptaculo inserta. *Bacca* 4-ocularis , polysperma.

264. *Myrtillus*. pedunculis unifloris , foliis ferratis ovatis deciduis , caule angulato. AIRELLE. MIRTILLE. *Vitis idæa* foliis oblongis , crenatis , fructu nigricante.

ERICA. *cal.* 4-phyllus. *cor.* 4-fida. *filam.* receptaculo inserta. *antheræ* bifidæ. *caps.* 4-ocularis.

265. *Vulgaris*. antheris aristatis , corollis campanulatis subæqualibus , calycibus duplicatis , foliis oppositis sagittatis. BRUYERE. *Erica vulgaris* glabra . . flore albo. e. *myricæ* folio , hirsuta. T.

DAPHNE. *cal.* o. *cor.* 4-fida , corollacea , marcescens , stamina includens. *bacca* 1-sperma.

266. *Mezereum*. floribus sessilibus ternis caulinis , foliis lanceolatis deciduis. BOIS GENTIL. LAUREOLE FEMELLE. *Thymelæa laurifolio* deciduo , sive laureola fœmina . . . flore albido , fructu flavescente. T.

267. *Laureola*. racemis axillaribus quinque floris , foliis lanceolatis glabris. LAUREOLE MALE. *Thymelæa laurifolio* , semper virens , seu laurea mas. T.

268. *Gnidium*. panicula terminali , foliis lineari-lanceolatis , acuminatis. GAROU. *Thymelæa* foliis lini. T.

Trigynia.

POLYGONUM. *cal.* o. *cor.* 5-partita , calycina. *sem.* 1 , angulatum.

269. *Bistorta*. caule simplicissimo monostachyo , foliis ovatis in petiolum decurrentibus. BISTORTE. *Bistorta* major , radice magis intortâ. T.

270. *Hydropiper*. floribus hexandris semi digynis , foliis lanceolatis , stipulis subinuticis. CURAGE. PERSICAIRE

CAIRE ACRE. POIVRE D'EAU. *Perficaria urens* sive *hydropiper*. T.

271. *Perficaria*. Floribus hexandris digynis , spicis ovato-oblongis , foliis lanceolatis , stipulis ciliatis. PERSICAIRE. *Perficaria mitis maculosa* . . . non maculosa. p. minor. p. angustifolia. T.
272. *Aviculare*. Floribus octandris trigynis axillaribus ; foliis lanceolatis , caule procumbente herbaceo. RENOUÉE. TRAINASSE. *Polygonum latifolium*. p. latif. fl. candido. p. oblongo (vel brevi) angustoque folio. T.
273. *Fagopyrum*. foliis cordato-sagittatis , caule erectiusculo inermi , seminum angulis æqualibus. BLED NOIR ou SARRASIN. *Fagopyrum vulgare erectum*. T

Tetragynia.

PARIS. cal. 4-phyllus. pet. 4, angustiora. bacca 4-locularis.

274. *Quadrifolia*. foliis quaternis. RAISIN DE RENARD. Herba paris. T.

CLASSIS IX^a. ENNEANDRIA.

Monogynia.

LAURUS. cal. o. cor. calycina , 6-partita. *Nectarium* glandulis tribus , bisetis , germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera. Drupa 1-sperma.

275. *Nobilis*. foliis lanceolatis venosis perennantibus ; floribus quadrifidis dioicis. LAURIER. *Laurus vulgaris*. T.

Trigynia.

RHEUM. *cal.* 0. *cor.* 6-fida, persistens. *sem.* 1, triquetrum.

276. *Rhaponticum.* foliis glabris, petiolis subfulcatis.
RAPONTIC. Rhubarbarum forte dioscoridis & antiquorum. T.

277. *Rhabarbarum.* foliis subvillosis, petiolis æqualibus.
RHUBARBE.

278. *Palmatum.* foliis palmatis acuminatis. RHUBARBE
DE TARTARIE.

CLASSIS X^a. DECANDRIA.*Monogynia.*

CASSIA. *cal.* 5-phyllus. *pet.* 3. *antheræ* supernæ
5 steriles: infimæ 3 rostratæ. *Legumen.*

279. *Senna.* foliis sexjugis subovatis, petiolis eglandulatis. SENNÉ. Senna alexandrina, sive foliis acutis.
S. italica f. foliis obtusis. T.

DICTAMNUS. *cal.* 5-phyllus. *pet.* 5, patula. *filam.*
punctis glandulosis adspersa. *caps.* 5.
coalitæ.

280. *Albus.* DICTAME BLANC. FRAXINELLE. Fraxinella. T.

RUTA. *cal.* 5-partitus. petala concava. *receptac.* punctis melliferis decem cinctum. *caps.* lobata.

281. *Graveolens.* foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis. RUE. Ruta hortensis latifolia.
sylvestris major . . . minor. T.

MELIA. *cal.* 5-dentatus. *pet.* 5. *nectarium* cylindricum,
ore *antheras* gerens corollæ. *Drupa* nucleo 5-
loculari.

282. *Azedarach.* foliis bipinnatis. FAUX SYCOMORE.
Azedarach . . a. semper virens & florens. T.

TRIBULUS. *cal.* 5-partitus. *petala* 5, patentia. *stylus* o. *caps.* 5, gibbæ, spinosæ polyspermæ.

283. *Terrestris*. foliolis sex jugatis subæqualibus, seminibus quadricornibus. CROIX DE CHEVALIER. tribulus terrestris, ciceris folio, feminum integumento aculeato. T.

ARBUTUS. *cal.* 5-partitus. *cor.* ovata : ore basi pellucida. *bacca* 5-locularis.

284. *Unedo*. caule arboreo, foliis glabris ferratis, bacis polyspermis. ARBOUSIER. Arbutus folio ferrato. T.

285. *Uva ursi*. caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. BOUSSEROLE. Uva ursi. T.

PYROLA. *cal.* 5-partitus. *pet.* 5. *caps.* 5-locularis, angulis dehiscens.

286. *Rotundifolia*. staminibus adscendentibus, pistillo declinato. PYROLE. Pyrola rotundifol. major. T.

Digynia.

AXIFRAGA. *cal.* 5-partitus. *cor.* 5-petala. *caps.* 2-rostris, 1-locularis, polysperma.

287. *Rotundifolia*. foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caule paniculato. GEUM. SANICLE DE MONTAGNE. Geum rotundifolium majus. T.

288. *Granulata*. foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. SAXIFRAGE GRANULÉE. Saxifraga rotundifolia alba. T.

SAPONARIA. *cal.* 1-phyllus, nudus. *petala* 5, unguiculata. *caps.* oblonga, 1-locularis.

289. *Officinalis*. Calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. SAPONAIRE. Lychnis sylvestris, quæ saponaria vulgo. T.

LIANTHUS. *cal.* cylindricus, 1-phyllus : basi squamis 4. *pet.* 5, unguiculata. *caps.* cylindrica 1-locularis.

290. *Caryophyllus*. floribus solitariis : squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. ŒILLET

DES JARDINS. *Caryophyllus hortensis simplex* flore majore . . & *variet.* T.

Trigynia.

CUCUBALUS. *cal.* inflatus. *petala* 5 , unguiculata , absque corona ad faucem. *capsf.* 3-locularis.

291. *Behen.* calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis , capsulis trilocularibus , corollis subnudis. BEHEN BLANC. *Lychnis sylvestris* quæ behen album vulgo. T.

Pentagynia.

COTYLEDON. *cal.* 15-fidus. *cor.* 1-petala. *squamæ* nectariferæ 5 , ad basin germinis. *capsf.* 5.

292. *Umbilicus.* foliis cucullato-peltatis serrato-dentatis alternis , caule ramoso , floribus rectis. NOMBRIL DE VENUS. *Cotyledon major.* T.

SEDUM. *cal.* 5-fidus. *cor.* 5-petala. *squamæ* nectariferæ 5 , ad basin germinis. *capsf.* 5.

293. *Telephium.* foliis planiusculis ferratis , corymbo folioso , caule erecto. ORPIN. REPRISE. *Anacampteros* vulgo faba crassa . . a. purpurea. a. min. purpurea. a. maxima. T.

294. *Rupestre.* foliis subulatis quinquefariam confertis basi solutis , floribus cymosis. SEDON DES ROCHERS. *Sedum minus* , luteum , folio acuto. T.

295. *Album.* foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus , cyma ramosa. SEDON BLANC. TRIQUE MADAME. *Sedum minus teretifolium* album . . . alterum. T.

296. *Acre.* foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis , cyma trifida. VERMICULAIRE BRULANTE. *Sedum parvum acre* flore luteo. T.

OXALIS. *cal.* 5-phyllus. *petala* unguibus connexa. *caps.* angulis dehiscens, 5-gona.

297. *Corniculata*. pedunculis umbelliferis, caule ramoso diffuso. *ALLELUYA. PAIN A COUCOU.* Oxys lutea. T.

AGROSTEMMA. *cal.* 1-phyllus, coriaceus. *petala* 5, unguiculata: limbo obtuso, indiviso. *caps.* 1-locularis.

298. *Coronaria*. tomentosa, foliis ovato-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis ferratis. *COQUELOURDE.* *Lychnis coronaria* sativa. & *variet.* T.

Decagynia.

PHYTOLACCA. *cal.* 0. *petala.* 5, calycina. *bacca* super 10-locularis, 10-sperma.

299. *Decandra*. floribus decandris. *RAISIN D'AMERIQUE.* *Phytolacca americana*, majori fructu. T.

CLASSIS XI^a. DODECANDRIA.

Monogynia.

ASARUM. *cal.* 3. f. 4-fidus, germini infidens. *cor.* 0. *caps.* coriacea, coronata.

300. *Europæum*. foliis reniformibus obtusis binis. *CABARET. OREILLE D'HOMME.* Asarum. T.

PORTULACA. *cor.* 5-*petala.* *cal.* 5-fidus. *caps.* 1-locularis circumscissa, aut 3-valvis.

301. *Oleracea*. foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *POURPIER.* *Portulaca latifolia* sive sativa. p. angustifolia f. sylvestris. T.

LYTHRUM. *cal.* 12-phyllus. *petala* 6, calyci inserta. *caps.* 2-locularis, polysperma.

302. *Salicaria*. foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris, *SALICAIRE.* *Salicaria*

38 DODECANDRIA MONOGYNIA.

vulgaris purpurea foliis oblongis. T.

AGRIMONIA. *cal.* 5-dentatus , altero obvallatus. *pet.* 5. *sem.* 2 , in fundo calycis.

303. *Eupatoria.* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato , fructibus hispidis. AIGREMOINE. Agrimonia officinarum. T.

RESEDA. *cal.* 1-phyllus , partitus. *petala* laciniata. *capsf.* ore dehiscens , 1-ocularis.

304. *Luteola.* foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis. Calycibus quadrifidis. GAUDE. Luteola herba falicis folio. T.

305. *Lutea.* foliis omnibus trifidis : inferioribus pinnatis. HERBE MAURE. Reseda vulgaris. r. crispa gallica. T.

306. *Phyteuma.* foliis integris trilobisque , calycibus sexpartitis maximis. RESEDA DES CHAMPS. R. minor vulgaris. R. m. v. folio minus inciso. R. m. v. fol. integris. T.

EUPHORBIA. *cor.* 4. *f.* 5-petala , calyci insidens. *cal.* 1-phyllus , ventricosus , *capsf.* 3-cocca.

307. *Officinarum.* aculeata nuda multangularis : aculeis geminatis. EUPHORBE.

308. *Lathyris.* umbella quadrifida : dichotoma , foliis oppositis integerrimis. EPURGE. Tithymalus latifolius catapucia dictus. T.

309. *Esula.* umbella multifida : bifida , involucellis subcordatis , petalis subbicornibus , ramis sterilibus , foliis uniformibus. ESULE. Tithymalus foliis pini , forte dioscoridis pithyusa. T.

310. *Characias.* umbella multifida : bifida , involucellis perfoliatis emarginatis ; foliis lanceolatis integerrimis , caule frutescente. TITHYMALE ROUGE. T. characias rubens peregrinus. T.

Dodecagynia.

SEMPERVIVUM. *cal.* 12-partitus. *petala* 12. *caps.* 12-
polypermæ.

311. *Tectorum.* foliis ciliatis , propaginibus patentibus.
JOUBARBE. Sempervivum majus vulgare. T.

CLASSIS XII^a. ICOSANDRIA.

Monogynia.

CACTUS. *cal.* 1-phyllus , superus , imbricatus.
cor. multiplex. *bacca* 1-locularis , poly-
sperma.

312. *Opuntia.* articulato - prolifer laxus , articulis ova-
tis , spinis setaceis. FIGUIER D'INDE. *Opuntia*
vulgò herbariorum. T.

313. *Cochenillifer.* Articulato-prolifer , articulis ovato-
oblongis subinermibus. RAQUETTE DE LA CO-
CHENILLE.

MYRTUS. *cal.* 5-fidus , superus. *petala* 5. *bacca* 2-f.
3-sperma.

314. *Communis.* floribus solitariis : involucro diphylo.
MYRTHE. *Myrtus latifolia romana. aliæq. species.*
T.

PUNICA. *cal.* 5-fidus superus. *petala* 5. pomum multi-
loculare polyspermum.

315. *Granatum.* foliis lanceolatis , caule arboreo. GRE-
NADIER. *Punicæ 9 species.* T.

AMYGDALUS. *cal.* 3-fidus , inferus. *petala* 5. drupa
nuce poris perforata.

316. *Perfica.* foliorum serraturis omnibus acutis , flori-
nus sessilibus solitariis. PECHER. *Perfica molli car-
ne & vulgaris viridis & alba & variet.* T.

317. *Communis.* foliorum serraturis infimis glandulosis ,

floribus sessilibus geminis. AMANDIER. Amygdalus fativa . . . dulcis . . . amara. T.

PRUNUS. *cal.* 5-fidus, inferus. petala 5. drupæ nux futuris prominulis.

318. *Laurocerasus*. floribus racemosis, foliis sempervirentibus dorso biglandulosis. LAURIER CERISE. *Laurocerasus*. T.

319. *Mahaleb*. floribus corymbosis terminalibus, foliis ovatis. PRUNIER ODORANT. BOIS DE STE. LUCIE. *Cerasus sylvestris amara mahaleb putata*. T.

320. *Armeniaca*. floribus sessilibus, foliis subcordatis. ABRICOTIER. *Armeniaca fructu majori, nucleo amaro nucleo dulci*. Arm. mala, minora. T.

321. *Cerasus*. umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. CERISIER. *Cerasus fativa, fructu rotundo, rubro & acido, &c.* T.

322. *Domestica*. pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. PRUNIER. *Prunus, &c.* T.

323. *Spinosa*. pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. PRUNIER ÉPINEUX. PRUNELLIER. *Prunus sylvestris*. T.

Digynia.

CRATÆGUS. *cal.* 5-fidus. petala 5. *bacca* infera disperma.

324. *Oxyacantha*. foliis obtusis subtrifidis ferratis. AUBEPINE. Mespillus, apii folio, sylvestris spinosa sive oxyacantha. T.

325. *Azarolus*. foliis obtusis subtrifidis subdentatis. AZEROLIER. Mespillus apii folio laciniato. T.

Trigynia.

SORBUS. *cal.* 5-fidus. petala 5. *bacca* infera, 3-sperma.

326. *Aucuparia*. foliis pinnatis utrinque glabris. SORBIER DES OISELEURS. s. *Aucuparia*. T.

327. *Domestica*. foliis pinnatis subtus villosis. SORBIER.
Sorbus fativa. T.

Pentagynia.

MESPILLUS. *cal.* 5-fidus. *pet.* 5. bacca infera, 5-sperma.

328. *Germanica*. inermis, foliis lanceolatis, subtus tomentosis, floribus sessilibus solitariis. NEFLIER.
Mesp. german. folio laurino non serrato. T.

PYRUS. *cal.* 5-fidus. petala 5. pomum inferum. 5-loculare, polyspermum.

329. *Communis*. foliis serratis lævibus, floribus corymbosis. POIRIER. Pyrus fativa . . . sylvestris. T.

330. *Malus*. foliis serratis, umbellis, sessilibus. POMMIER. Malus pumila . . . sylvestris . . fativa, &c. T.

331. *Cydonia*. foliis integerrimis, floribus solitariis. COIGNASSIER. Cydonia, &c.

SPIRÆA. *cal.* 5-fidus. petala 5. *caps.* polyspermæ.

332. *Filipendula*. foliis pinnatis. foliolis uniformibus. serratis, caule herbaceo, floribus corymbosis. FILIPENDULE. Filipendula vulgaris. T.

333. *Ulmaria*. foliis pinnatis: impari majore lobato floribus cymosis. REINE DES PRÉS. Ulmaria. T.

Polygynia.

ROSA. *petala* 5. *cal.* urceolatus, 5-fidus, carnosus; collo coarctatus. *sem.* plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa.

334. *Eglanteria*. Germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis acutis. ROSIER EGLANTIER. Rosa sylvestris foliis odoratis . . r. lutea simplex . . . multiplex. T.

335. *Sempervirens*. Germinibus globosis pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis, floribus

subumbellatis. ROSE MUSQUÉE. r. moschata sem-
pervirens. T.

336. *Centifolia*. Germinibus ovatis pedunculisque hispi-
dis, caule hispido aculeato, petiolis inermibus.
ROSE ROUGE. Rosa multiplex media. T.

337. *Canina*. Germinibus ovatis pedunculisque aculea-
tis. EGLANTIER. GRATTE-CUL. KYNORRHODON.
Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato, incarna-
to. T.

338. *Alba*. Germinibus ovatis glabris, pedunculis his-
pidis, caule petiolisque aculeatis. ROSIER BLANC.
Rosa alba vulgaris major. T.

RUBUS. *cal.* 5-fidus. petala 5. bacca composita acinis
monospermis.

339. *Idæus*. foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule
aculeato, petiolis canaliculatis. FRAMBOISIER.
Rubus idæus spinosus. (lævis.) (fructu albo.) T.

340. *Fruticosus*. foliis quinato digitatis ternatisque,
caule petiolisque aculeatis. RONCE. Rubus vulga-
ris, sive r. fructu nigro. T.

FRAGARIA. *cal.* 10-fidus. petala 5. receptaculum se-
minum ovatum, baccatum, deciduum.

341. *Vesca*. flagellis reptantibus. FRAISIER. Fragaria
vulgaris. fr. fructu albo, &c. T.

POTENTILLA. *cal.* 10-fidus. petala 5. semina subro-
tunda, nuda, receptaculo parvo
exsucco affixa.

342. *Anserina*. foliis pinnatis ferratis, caule repente,
pedunculis unifloris. ARGENTINE. Pentaphylloides
argenteum, alatum, seu potentilla. T.

343. *Reptans*. foliis quinatis, caule repente, pedun-
culis unifloris. QUINTEFEUILLE. Quinquefolium
majus repens.

TORMENTILLA. *cal.* 8-fidus. petala 4. sem. subro-
tunda, nuda, receptaculo parvo
exsucco affixa.

344. *Erecta*. caule erectiusculo, foliis sessilibus. TOR-
MENTILLE. Tormentilla sylvestris. T.

GEUM. *cal.* 10-fidus. *petala* 5. *sem.* arista geniculata.
345. *Urbanum.* floribus erectis, fructibus globosis vil-
lofis : aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. BENOI-
TE. Caryophyllata vulgaris. T.

CLASSIS XII^a. POLYANDRIA.

Monogynia.

CAPPARIS. *cal.* 4-phyllus, coriaceus. *petala* 4.
stam. longa. *bacca* corticosa, locu-
laris pedunculata.

346. *Spinosa.* pedunculis unifloris solitariis, stipulis spi-
nosus, foliis annuis, capsulis ovalibus. CAPRIER.
capparis spinosa fructu minore, folio rotundo. c.
folio acuto. c. sicula duplicata spina, folio acuto.
T.

ACTÆA. *cor.* 4-petala. *cal.* 4-phyllus. *bacca* 1-locula-
ris. *sem.* semiorbiculata.

347. *Spicata.* racemo ovato, fructibus baccatis. HERBE
DE ST. CHRISTOPHE. Christophoriana vulgaris,
nostras, racemosa & ramosa. T. *Spicata nigra.*
Christ. americana, baccis niveis . . . rubris. T.

CHELIDONIUM. *cor.* 4-petala. *cal.* 2-phyllus. Siliqua
1-ocularis, linearis.

348. *Majus.* pedunculis umbellatis. GRANDE CHELI-
DOINE. ECLAIRE. Chelidonium majus vulgare. c.
maj. foliis quernis variegatis. T.

349. *Glaucium.* pedunculis unifloris, foliis amplexicau-
libus sinuatis, caule glabro. PAVOT CORNU. Glau-
cium flore luteo. T.

PAPAVER. *cor.* 4-petala. *cal.* 2-phyllus. *capsf.* 1-locu-
laris, sub stigmate persistente poris dehif-
cens.

350. *Rhæas.* capsulis glabris globosis, caule piloso mul-
tifloro, foliis pinnatifidis incis. COQUELICOT.

44 POLYANDRIA MONOGYNIA.

Papaver erraticum majus ... minus. T.

351. *Somniferum*. calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisfis. PAVOT. *Papaver hortense* .. p. cristatum .. p. flore pleno. T.

352. *Orientale*. capsulis glabris, caulibus unifloris scabris foliosis, foliis pinnatis ferratis. P. ORIENTAL. *Papaver orientale hirsutissimum* flore magno. T.

NYMPHÆA. cor. polypetala. cal. 4 f. 5-phyllus. bacca multilocularis truncata.

353. *Lutea*. foliis cordatis integerrimis, calyce petalis majore pentaphyllo. NÉNUPHAR JAUNE. *Nymphæa lutea* major. T.

354. *Alba*. foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. NÉNUPHAR BLANC. *Nymphæa alba* major. T.

TILIA. cor. 5-petala. cal. 5-partitus. bacca sicca, globosa, 5-locularis, 5-valvis, basi dehiscens.

355. *Europæa*. floribus nectario destitutis. TILLEUL. *Tilia fœm. fol. majore* ... minore. T. foliis molli-ter hirsutis, viminibus rubris, fructu tetragono. T.

THEA. cor. 6-f. 9-petala. cal. 5-f. 6-phyllus caps. 3-cocca.

356. *Bohea*. floribus hexapetalis. THÉ DE CHINE.

CISTUS. cor. 5-petala. cal. 5-phyllus: foliolis duobus minoribus. capsula.

357. *Laurifolius*. arborescens exstipulatus, foliis oblongo-ovatis petiolatis trinerviis suprâ glabris: petiolis basi connatis. CISTE A FEUILLES DE LAURIER. *Cistus ledon* foliis laurinis. T.

358. *Ladaniferus*. arborescens exstipulatus, foliis lanceolatis suprâ lævibus: petiolis basi coalitis vaginantibus. CISTE DU LADANUM. *Cistus ladanifera hispanica*, salicis folio. T.

359. *Monspeliensis*. arborescens exstipulatus, foliis lineari-lanceolatis sessilibus utrinque villosis trinerviis. CISTE DE MONTPELLIER. *Cistus ladanifera Monspeliensium*. C. ledon fol. oleæ sed angustioribus. T.

CORCHORUS. *cor.* 5-petala. *cal.* 5-phyllus, deciduus
capsf. plurivalvis, loculamentosa.

360. *Oliorius.* capsulis oblongis ventricosis, foliorum
ferraturis infimis setaceis. MELOCHIE POTAGERE.
Corchorus five melochia. T.

Digynia.

PÆONIA. *cal.* 5-phyllus. petala 5. styli. o. *capsf.* Poly-
spermæ.

361. *Officinalis.* foliolis oblongis. PIVOINE OFFICINALE.
Pæonia mascul. p. fœmina. T.

Trigynia.

DELPHINIUM. *cal.* o. *pet.* 5. nectarium bifidum ;
postice cornutum. siliquæ 3. f. 1.

362. *Consolida.* nectariis monophyllis, caule subdiviso.
PIED D'ALOUETTE DES CHAMPS. Delphinium se-
getum. T.

363. *Ajaxis.* nectariis monophyllis, caule simplici.
PIED D'ALOUETTE DES JARDINS. Delphinium
hortense. T.

364. *Staphisagria.* nectariis tetraphyllis petalo breviori-
bus, foliis palmatis : lobis obtusis. HERBE AUX
POUX. Delphinium platani folio, staphisagria
dictum. T.

ACONITUM. *cal.* o. petala 5. supremo fornicato.
nectaria 2, pedunculata, recurva. si-
liquæ 3. f. 5.

365. *Lycostonum.* foliis palmatis multifidis villosis. ACO-
NIT TUE LOUP. Acon. lycostonum luteum. T.

366. *Napellus.* foliorum laciniis linearibus superne la-
tioribus, linea exaratis. ACONIT. NAPEL. Aconi-
tum cærulæum seu napellus. T.

367. *Anthora.* floribus pentaginis, foliorum laciniis li-
nearibus. ACONIT ANTHORA. Aconitum salutife-
rum seu anthora. T.

Pentagynia.

AQUILEGIA. *cal. o. petala 5. nectaria 5*, corniculata, interpetales, *caps. 5*, distinctæ.

368. *Vulgaris*. nectariis incurvis. ANCOLIE. EGLANTINE. Aquilegia sylvestris. a. hortensis. T.

NIGELLA. *cal. o. petala 5. nectaria 5*, 3-fida intrâ corollam. *caps. 5*, connexæ.

369. *Sativa*. pistillis quinis capsulis muricatis subrotundis, foliis subpilosis. TOUTE ÉPICE. Nigella flore minore simplici candido. n. fl. min. pleno & albo. T.

370. *Arvensis*. pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis. NIELLE DES CHAMPS. Nigella arvensis cornuta.

Polygynia.

ANEMONE. *cal. o. petala 6-9. sem. plura.*

371. *Hepatica*. foliis trilobis integerrimis. ANEMONE HÉPATIQUE. Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici cæruleo . . . violaceo . . . subpurpureo . . . rubro, &c. flore pleno . . . variegato. T.

372. *Pulsatilla*. pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. COQUELOURDE. PULSATILLE. Pulsatilla flore crassiore & majore flore. T.

373. *Pratensis*. pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. ANEMONE DES PRÉS. pulsatilla flore minore nigricante. T.

374. *Nemorosa*. feminibus acutis, foliolis incisfis, caule unifloro. ANEMONE DES BOIS. SILVIE. Ranunculus phragmites albus vernus . . . purpureus vernus. T.

CLEMATIS. *cal. o. petala 4, rarius 5. sem. caudata.*

375. *Vitalba*. foliis pinnatis : foliolis cordatis scandentibus. CLEMATITE DES HAIES. HERBE AUX GUEUX. Clematitis sylvestris latifolia . . . foliis non incisfis. T.

376. *Flammula*. foliis inferioribus pinnatis laciniatis :
summis simplicibus integerrimis lanceolatis. HER-
BE AUX GUEUX BRULANTE. Clematitis sive flam-
mula repens . . . surrecta alba. T.

THALICTRUM. *cal.* o. *petala* 4 f. 5. *semina* ecau-
data.

377. *Flavum*. caule folioso sulcato , panicula multiplici
erecta. RHUE DES PRÉS. PEGAMON. FAUSSE RHU-
BARBE. Thalictrum majus , siliquâ angulosâ aut
striatâ.

ADONIS. *cal.* 5-phyllus. *petala* quinis plura absque
nectario. *sem.* nuda.

378. *Æstivalis*. floribus pentapetalis , fructibus ovatis.
ADONIS D'ÉTÉ. Ranunculus arvensis , foliis cha-
mæmeli , flore phæniceo . . . flore citrino. T.

379. *Vernalis*. flore dodecapetalo : fructu ovato. ADO-
NIS PRINTANIER. HELLEBORE D'HYPOCRATE.
Ranunculus fœniculaceis foliis , hellebori nigri
radice. T.

RANUNCULUS. *cal.* 5-phyllus. *petala* 5, intrâ unguis
poro mellifero. *sem.* nuda.

380. *Flammula*. foliis ovato-lanceolatis petiolatis , caule
declinato. RENONCULE FLAMME. Ranunculus lon-
gifolius palustris minor. r. palustris ferratus. T.

381. *Ficaria*. foliis cordatis angulatis petiolatis , caule
unifloro. PETITE CHELIDOINE. Ranunculus ver-
nus rotundifolius major . . . minor. T.

382. *Sceleratus*. foliis inferioribus palmatis ; summis di-
gitatis , fructibus oblongis. RENONCULE SCÉLÉ-
RATE. REN. DES MARAIS. PIED-POU. R. palus-
tris , apii folio , lævis. T.

383. *Acris*. calycibus patulis , pedunculis teretibus ,
foliis tripartito multifidis : summis linearibus. RE-
NONCULE ACRE. BOUTON D'OR. R. pratensis erec-
tus acris. T.

384. *Aquatilis*. foliis submersis capillaceis , emersis
peltatis. RENONCULE AQUATIQUE. R. aquaticus
folio rotundo & capillaceo. R. aquaticus capilla-

ceus. R. aq. albus, fluitans, peucedani foliis. T.
HELLEBORUS. *cal.* o. petala 5-f. plura. nectaria bilabiata, tubulata. *capsf.* polyspermæ, erectiusculæ.

385. *Niger.* scapo subbifloro subnudo, foliis pedatis. **HELLEBORE NOIR.** Helleborus niger angustioribus foliis. T.

386. *Viridis.* caule bifido, ramis foliosis bifloris, foliis digitatis. **HELLEBORE VERD.** Helleborus niger hortensis, flore viridi. T.

387. *Fætidus.* caule multifloro folioso, foliis pedatis. **HELLEBORE PUANT. PIED DE GRIFFON.** Helleborus niger fœtidus. T.

CLASSIS XIV^a. DIDYNAMIA.

Gymnospermia.

AJUGA. *corollæ* labium superius minimum. Stamina labio superiore longiora.

388. *Pyramidalis.* tetragono pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. **BUGLE PYRAMIDALE.** Bugula sylvestris, villosa, flore suave rubente. T.

389. *Reptans.* stolonibus reptantibus. *Glabra.* **BUGLE RAMPANTE.** Bugula. T.

TEUCRIUM. *corollæ* labium superius (nullum) ultra basin bipartitum, divaricatum ubi stamina.

390. *Chamæpithys.* foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. **GERMANDRÉE IVETTE.** Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido. ch. vulg. fol. trifid. flore roseo, lusitanica. T.

391. *Iva.* foliis subtricuspidatis linearibus, floribus sessilibus, lateralibus solitariis. **IVETTE MUSQUÉE.** Chamæpitys moschata foliis serratis. T.

392. *Marum*. foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis : subtus tomentosis , floribus racemosis secundis.
MARUM. HERBE AUX CHATS. Chamædrys maritima incana frutescens foliis lanceolatis. T.
393. *Scorodonia*. foliis cordatis ferratis petiolatis , racemosis lateralibus secundis , caule erecto. FAUX SCORDIUM. SAUGE SAUVAGE. Chamædrys fruticosa , sylvestris , melissæ folio. T.
394. *Scordium*. foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis , floribus geminis axillaribus pedunculatis , caule diffuso. SCORDIUM. Chamædrys palustris canescens , seu scordium officinarum. T.
395. *Chamædrys*. foliolis cuneiformi-ovatis incisís crenatis petiolatis , floribus ternis , caulibus procumbentibus subpilosis. GERMANDRÉE. PETIT CHENE. Chamædrys major repens. ch. min. repens. T.
396. *Montanum*. corymbo terminali , foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. POLIUM DE MONTAGNE. Polium lavandulæ folio. T.
397. *Polium*. capitulis subrotundis , foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus , caule prostrato. POLIUM A FLEUR JAUNE. P. A FL. BLANCHE. Pol. montanum album . . p. m. luteum. p. m. supinum alterum. p. marit. venetum. T.
- SAUREIA. cor. laciniae subæquales. *flam.* distantia.
398. *Hortensis*. pedunculis bifloris. SARIETTE. Satureia sativa. T.
- HYSSOPUS. cor. labium inferius lacinia intermedia crenata. *flam.* recta , distantia.
399. *Officinalis*. spicis secundis : foliis lanceolatis. HYSSOPE. Hyssopus officinarum cærulea seu spicata. H. rubro flore. T.
- NEPETA. corollæ lab. inferius lacinula intermedia crenata , faux margine reflexo. *flam.* approximata.
400. *Cataria*. floribus spicatis , verticillis subpedicellatis , foliis petiolatis cordatis , dentato-ferratis. HERBE

AUX CHATS. *Cataria* major vulgaris. c. minor vulg. T.

LAVANDULA. *cal.* ovatus, subdentatus, bractea suffultus. *corolla* resupinata. *stamina* intra tubum.

401. *Spica*. foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis. LAVANDE MALE. L. FEMELLE. ASPIC. NARD. *Lavandula* latifolia . . . angustifolia. T.

402. *Stæchas*. foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, spicis comosis. STÆCHAS. *Stæchas* purpurea. *stæchas* cauliculis non foliatis. T.

MENTHA. *cor.* subæqualis, 4-fida : lacinia latiore emarginata. *stamina* erecta distantia.

403. *Viridis*. spicis oblongis, foliis lanceolatis nudis ferratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. MENTHE VERTE. M. D'ANGLETERRE. *Mentha* angustifolia spicata. m. sylvestris, longioribus, nigrioribus & minus incanis foliis. T.

404. *Rotundifolia*. Spicis oblongis, foliis subrotundis rugosis crenatis sessilibus. MENTHE SAUVAGE. MENTHASTRE. *Mentha* sylvestris rotundiore folio. T.

405. *Aquatica*. floribus capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. MENTHE AQUATIQUE. *Mentha* rotundifolia, palustris seu aquatica, major. T.

406. *Piperita*. spicis capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus MENTHE POIVRÉE.

407. *Gentilis*. floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ferratis, staminibus corolla brevioribus. BAUME DES JARDINS. *Mentha* hortensis verticillata ocyini odore. T.

408. *Pulegium*. floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. POULIOT A LARGES FEUILLES. *Mentha* aquatica seu pulegium vulgare. T.

409. *Cervina*. floribus verticillatis, bracteis palmatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus. POULIOT A FEUILLES ÉTROITES. Mentha aquatica satureiæ folio. T.

GLECOMA. *antherarum* singulum par in formam crucis connivens. cal. 5-fidus.

410. *Hederacea*. foliis reniformibus crenatis. LIERRE TERRESTRE. Calamintha humilior folio rotundior. T.

LAMIUM. *cor.* labium superius integrum, fornicatum; lab. inf. 2-lobum; faux uniusque margine dentata.

411. *Album*. foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis viginti-floris. ORTIE BLANCHE. ARCHANGELIQUE. Lamium vulgare, album, sive archangelica, flore albo. T.

412. *Purpureum*. foliis cordatis obtusis petiolatis. LAMIER POURPRE. Lamium purpureum foetidum folio subrotundo. T.

GALEOPSIS. *corollæ* labium superius subcrenatum, fornicatum; lab. inf. supra 2-dentatum.

413. *Galeobdolon*. verticillis sexfloris; involucri tetraphyllo. ORTIE MORTE A FLEUR JAUNE. Galeopsis sive urtica iners flore luteo. T.

BETONICA. *cal.* aristatus. *corollæ* labium superius adscendens, planiusculum; tubus cylindricus.

414. *Officinalis*. spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. BÉTOINE. Betonica purpurea. b. alba. T.

STACHYS. *cor.* lab. superius fornicatum, lab. infer. lateribus reflexum: intermedia majore emarginata. *flam.* deflorata versus latera reflexa.

415. *Sylvatica*. verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. ORTIE MORTE DES BOIS. Galeopsis procerior, foetida spicata. T.

416. *Palustris*. verticillis sub sex floris; foliis lineari-

52 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

lanceolatis semi-amplexicaulibus sessilibus. ORTIE MORTE DES MARAIS. Galeopsis palustris , betoniæ folio , flore variegato. T.

417. *Germanica*. verticillis multifloris , foliorum ferraturis imbricatis , caule lanato. ÉPI FLEURI. STACHIS LANUGINEUX. Stachys major , germanica. T.

BALLOTA. *cal.* hypocrateriformis , 5-dentatus , 10-fstriatus. *corollæ* lab. super. crenatum , concavum.

418. *Nigra*. foliis cordatis indivisis ferratis , calycibus acuminatis. MARRUBE NOIR. Ballote. T.

MARRUBIUM. *cal.* hypocrateriformis , rigidus , 10-fstriatus. *corollæ* lab. super. bifidum , lineare , rectum.

419. *Vulgare*. dentibus calycinis setaceis uncinatis. MARRUBE BLANC. Marrub. album vulgare. M. alb. villosum. T.

420. *Pseudo-Dictamnus*. calycum limbis planis villosis , foliis cordatis concavis , caule fruticoso. FAUX DICTAME. Pseudo-Dictamnus verticillatus inodorus. T.

LEONURUS. antheræ punctis nitidis , adspersæ.

421. *Cardiaca*. foliis caulinis lanceolatis trilobis. AGRIPAUME. Cardiaca T. Cardiaca flore albo. T.

PHLOMIS. *cal.* angulatus. *corollæ* labium superius incumbens , compressum , villosum.

422. *Fruticosa*. foliis subrotundis tomentosis crenatis , involucris lanceolatis , caule fruticoso. BOUILLON SAUVAGE. SAUGE EN ARBRE. Phlomis fruticosa , salviæ folio latiore & rotundiore. T.

MOLUCELLA. *calyx* campanulatus , ampliatus , corolla latior , spinosus.

423. *Lævis*. calycibus campanulatis sub quinque dentatis : denticulis æqualibus. MELISSE DES MOLUQUES. Molluca lævis. T.

424. *Spinosa*. calycibus ringentibus octodentatis. MOLUQUE ÉPINEUSE. Molluca spinosa. T.

CLINOPODIUM. *involucrum* multifetum , verticillo subjectum.

425. *Vulgare.* capitulis subrotundis hispidis, bracteis fetaceis. GRAND BASILIC SAUVAGE. Clinopodium origano simile, elatius, majore folio. T.

ORIGANUM. Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens.

426. *Dictamnus.* foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus. DICTAME DE CRETE. Organum creticum, latifolium, tomentosum, seu dictamnus creticus. T.

427. *Vulgare.* spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. ORIGAN. Organum sylvestre, cunila bubula plinii. T.

428. *Marojana.* foliis obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. MARJOLAINE. Majorana vulgaris. T.

THYMUS. calycis bilabiati faux villis clausa.

429. *Serpillum.* floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. SERPOLET. Serpilli undecim priores species. T.

430. *Vulgaris.* erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillatis spicatis. THIM. COMMUN. Thymus vulgaris folio latiore .. fol. tenuiore. th. supinus candicans odoratus. th. capitulis minoribus massiliensis. T.

431. *Acinos.* floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis ferratis. THIM CHAMPETRE. Clinopodium arvense ocymifacie. T.

432. *Mastichina.* floribus verticillatis, calycibus lanuginosis: dentibus calycinis fetaceis villosis. MARJOLAINE D'ANGLETERRE. Thymbra hispanica majoranæ folio. T.

MELISSA. calyx aridus, supra planiusculus: labio superiore sub fastigiato. corollæ labium superius subfornicatum, 2-fidum; labium inferius lobo medio cordato.

433. *Officinalis.* racemis axillaribus verticillatis: pedi-

54 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

cellis simplicibus. MELISSE. CITRONNELLE. Melissa hortensis. T.

434. *Grandiflora*. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. GRAND CALAMENT DE MONTAGNE. Calamintha magno flore. T.

435. *Calamintha*. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. CALAMENT. Calamintha vulgaris vel officinarum germaniæ. T.

436. *Nepeta*. pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adscendente hirsuto. CALAMENT A ODEUR DE POULIOT. Calamintha pulegii odore sive nepeta. c. montana præalata; &c. T.

DRACOCEPHALUM. Corollæ faux inflata, labium superius concavum.

437. *Canariense*. floribus spicatis, foliis compositis. MELISSE DE CANARIE. Moldavica americana, trifolia, odore gravi. T.

438. *Moldavica*. floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ferraturis capillaceis. MELISSE DE MOLDAVIE. Moldavica betonica folio, flore cærulæo. T.

MELITTIS. *calyx* tubo corollæ amplior. *corollæ* labium superius planum: lab. infer. crenatum. antheræ cruciatæ.

439. *Melissophyllum*. MELISSE DES BOIS. Melissa humilis, latifolia, maximo flore purpurascens. T.

OCYUM. *calyx* labio superiore orbiculato; inferiore quadrifido. *corollæ* resupinatae alterum labium 4-fidum; alterum indivisum. *Filamenta* exteriora basi processum emittentia.

440. *Basilicum*. foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. GRAND BASILIC. Ocimum cariophyllatum maximum. oc. car. majus. T.

441. *Minimum*. foliis ovatis integerrimis. PETIT BASILIC. Ocym. minimum. T.

SCUTELLARIA. *calyx* ore integro: post florescentiam clauso, operculato.

442. *Galericulata*. foliis cordato-lanceolatis crenatis , floribus axillaribus. TOQUE DES MARAIS. Cassida palustris vulgarior , flore cærulæo. T.

PRUNELLA. *Filamenta* bifurca : altero apice antherifera. *stigma* bifidum.

443. *Vulgaris*. foliis omnibus ovato-oblongis ferratis petiolatis. BRUNELLE COMMUNE. Brunellæ 7 *prior species*. T.

Angiospermia.

EUPHRASIA. *cal.* 4-fidus cylindricus. *capsf.* 2-locularis , ovato-oblonga. *antheræ* inferiores altero lobo basi spinosæ.

444. *Officinalis*. foliis ovatis lineatis argute dentatis. EUPHRAISE. Euphrasia officinarum. T.

ANTIRRHINUM. *cal.* 5-phyllus. *corollæ* basis deorsum prominens , nectarifera. *capsf.* bilocularis.

445. *Cymbalaria*. foliis cordatis quinquelobis alternis , caulibus procumbentibus. CYMBALAIRE. Linaria hederaceo folio glabro seu cymbalaria vulgaris. T.

446. *Elatine*. foliis hastatis alternis , caulibus procumbentibus. VELVOTE. Linaria segetum nummulariæ folio aurito & villoso , flore luteo fl. cærulæo. T.

447. *Spurium*. foliis ovatis alternis , caulibus procumbentibus. VELVOTE FEMELLE. Linaria segetum nummulariæ folio villoso. T.

448. *Linaria*. foliis lanceolato-linearibus confertis , caule erecto , spicis terminalibus sessilibus , floribus imbricatis. LINAIRE COMMUNE. Linaria vulgaris lutea flore majore. T.

449. *Majus*. corollis ecaudatis. MUFLE DE VEAU. Antirrh. vulgare. T.

SCROPHULARIA. *cal.* 5-fidus , *cor.* subglobosa , resupinata. *capsf.* 2-locularis.

450. *Nodosa*. foliis cordatis trinervatis , caule obtusan-

56 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

sangulo. *SCROPHULAIRE DES BOIS*. Scrophul. nodosa foetida. T.

451. *Aquatica*. foliis cordatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranis angulato racemis terminalibus. *SCROPHULAIRE AQUATIQUE*. Scrophularia aquatica major. T.

DIGITALIS. *cal.* 5-partitus. *cor.* campanulata, 5-fida, ventricosa. *capsf.* ovata, 2-locularis.

452. *Purpurea*. L. T. calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro. *DIGITALE*.

CAPRARIA. *cal.* 5-partitus. *cor.* campanulata, 5-fida, acuta. *capsf.* 2-valvis, 2-locularis, polysperma.

453. *Biflora*. foliis alternis, floribus geminis. *THÉ DE CURAÇAO*. Ageratum americanum folio & facie rapunculi. T.

OROBANCHE. *cal.* 2-fidus. *cor.* ringens. *capsf.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma. Glandulae sub basi germinis.

454. *Major*. caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. *GRANDE OROBANCHE*. Orobanche major caryophyllum olens. T.

VITEX. *cal.* 5-dentatus. *cor.* limbus 6-fidus. bacca 4-sperma.

455. *Agnus castus*. foliis digitatis serratis, spicis verticillatis. *AGNUS CASTUS*. Vitex latiore folio. v. fol. angustioribus cannabis modo dispositis. T.

ACANTHUS. *cal.* bifol. bifidus. *cor.* 1-labiata, deflexa 3-fida. *capsf.* 2-locularis.

456. *Mollis*. foliis sinuatis inermibus. *ACANTE. BRANCURSINE*. Acanthus fativus vel mollis virgillii. T.



CLASSIS XV^a. TETRADYNAMIA:*Siliculosa.*

MYAGRUM. *Silicula* stylo conico terminata ,
loculo submonospermo.

457. *Sativum*. filiculis obovatis pedunculatis polyspermis. CAMELINE CULTIVÉE. Alysson segetum , foliis auriculatis , acutis. T.

ANASTATICA. *Silicula* retusa , margine coronata valvulis dissepimento duplo longioribus. *stylo* intermedio mucronato , obliquo , loculis 1-spermis.

458. *Hierochuntica*. foliis obtusis , spicis axillaribus brevissimis , filiculis angulatis spinosis. ROSE DE JERICO. *Thlaspi* rosa de Hiericho dictum. T.

LEPIDIUM. *Silicula* emarginata , cordata , polysperma : valvulis carinatis , dissepimento contrariis.

459. *Sativum*. floribus tetradynamis , foliis oblongis multifidis. NASITOR. CRESSON ALENOIS. Nasturtium hortense , vulgatum. n. h. crispum. T.

460. *Latifolium*. L. T. foliis ovato-lanceolatis integris ferratis. GRANDE PASSERAGE.

461. *Iberis*. floribus diandris tetrapetalis , foliis inferioribus lanceolatis ferratis : superioribus linearibus integerrimis. PETITE PASSERAGE. *Lepidium* gramineo folio , sive *iberis*. T.

THLASPI. *silicula* emarginata , obcordata , polysperma , valvulis navicularibus , marginato carinatis.

462. *Arvense*. filiculis orbiculatis , foliis oblongis dentatis glabris. SENEVE SAUVAGE. MONOYERE. *Thlaspi* arvense , filiquis latis. T.

463. *Campestre*. filiculis subrotundis , foliis sagittatis

58 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

dentatis incanis. THLASPI CHAMPETRE. Thlaspi vulgatus. thl. vaccariæ incano folio minus. T.

464. *Bursa-pastoris*. filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. TABOURET. BOURSE A PASTEUR. Bursa pastoris major folio sinuato. b. p. in. fol. non sinuato. b. p. media. T.

COCHLEARIA. *Silicula* emarginata, turgida, scabra; valvulis gibbis, obtusis.

465. *Officinalis*. foliis radicalibus cordato-subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. COCHLEARIA HERBB AUX CUILLERS. Cochlearia folio subrotundo. T.

466. *Coronopus*. foliis pinnatifidis, caule depresso. COCHLEARIA RAMPANT. Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. T.

467. *Armoracia*. foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulibus incis. GRAND RAIFORT SAUVAGE. Cochlearia folio cubitali. T. Raphanus rusticanus officinarum.

BISCUPELLA. *Silicula* compresso-plana, rotundata, supra infraque biloba. cal. foliola basi gibba.

468. *Apula*. filiculis scabris, foliolis lanceolatis sessilibus serratis. LUNETIERE. Thlaspidium Monsperliense, hieracii folio hirsuto. thasp. apulum, spicatum. T.

LUNARIA. *Silicula* integra elliptica, compresso-plana, pedicellata; valvis dissepimento æqualibus parallelis, planis. cal. foliolis siccatis.

469. *Rediviva*. foliolis alternis. LUNAIRE ODORANTE. Lunaria major filiqua longiore. T.

Siliquosa.

DENTARIA. *Siliqua* elastice dissiliens valvulis revolutis. stigma. emarginatum. cal. longitudinaliter connivens.

470. *Pentaphyllos*. foliis summis digitatis. DENTAIRE

Dentaria heptaphyllos. d. pentaphyllos foliis mollioribus. d. p. fol. asperis. T.

CARDAMINE. *Siliqua* elastice diffiliens valvulis revolutis. *stigma* integrum. *cal.* subhiatus.

471. *Hirsuta*. foliis pinnatis, floribus tetrandris. PETIT CRESSON D'EAU. Cardamine quarta dalechampii. T.

472. *Amara*. foliis pinnatis, axillis stoloniferis. GRAND CRESSON D'EAU. Cardamine flore majore, elatior. T.

SISYMBRIUM. *siliqua* dehiscens valvulis rectiusculis. *calyx* patens. *corolla* patens.

473. *Nasturtium*. siliquis declinatis, foliis pinnatis foliolis subcordatis. CRESSON DE FONTAINE. Sisymbrium aquaticum. T.

474. *Tenuifolium*. foliis integerrimis, infimis tripinnatifidis; supremis integris. ROQUETTE SAUVAGE VIVACE. Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo. T.

475. *Sophia*. petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. THALICTRON DES BOUTIQUES. Sisymbrium annuum, absinthii minoris folio. T.

ERYSIMUM. *Siliqua* columnaris, *cal.* tetraëdra. *cal.* clausus.

476. *Officinale*. Siliquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. VELAR TORTELLE. Erysimum vulgare. T.

477. *Barbarea*. foliis lyratis ex timo subrotundo. HERBE DE STE. BARBE. RONDOTE. Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. T.

478. *Alliaria*. foliis cordatis. ALLIAIRE. Hesperis alium redolens. T.

CHEIRANTHUS. *Germen* utrinque denticulo glandulato. *cal.* clausus: foliolis basi gibbis. *semina* plana.

479. *Cheiri*. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. GIROFLÉE JAUNE. Leucoium luteum vulgare. T.

HESPERIS. *Petala* oblique flexa. *Glandula* intra sta-

mina breviora. Siliqua stricta. *Stigma* basi bifurca apice connivente. *cal.* clausus.

480. *Matronalis*. caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. JULIENNE GIRARDE. Hesperis hortensis. T.
TURKITIS. Siliqua longissima, angulata. *cal.* connivens erectus. *cor.* erecta.
481. *Hirsuta*. foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. TOURRETTE VELUE. Turritis minor. T.
BRASSICA. *cal.* erectus connivens. *sem.* globosa. *Glandula* inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem.
482. *Napus*. radice caulescente fusiformi. NAVET. Napus sativa. n. sylvestris. T.
483. *Rapa*. radice caulescente orbiculari depressa carnosa. RAVE. Rapa sativa rotunda . . . oblonga. T.
484. *Oleracea*. radice caulescente tereti carnosa. CHOU POTAGER. Brassica capitata alba, &c. T.
485. *Eruca*. foliis lyratis, caule hirsuto, filiquis glabris. ROQUETTE. eruca latifolia alba. T.
- SINAPIS**. *cal.* patens. *cor.* ungues recti. *glandula* inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem.
486. *Arvensis*. filiquis multangulis, toroso turgidis rostro ancipite longioribus. MOUTARDE DES CHAMPS. sinapi arvense præcox, semine nigro. T.
487. *Nigra*. filiquis glabris racemo appressis. MOUTARDE NOIRE. sinapis rapi folio. T.
488. *Lævigata*. filiquis lævibus patulis, foliis lyratis glabris : summis lanceolatis, caule lævi. MOUTARDE LISSE.
- RAPHANUS**. *cal.* clausus. *siliqua* torosa, subarticulata, teres. Glandulæ melliferæ 2 inter stamina breviora & pistillum, totidem inter stamina longiora & calycem.
489. *Sativus*. filiquisteretibus torosis bilocularibus. RAIFORT. RADIS CULTIVÉ. Raphanus major orbicularis vel rotundus. id. floribus candidis. r. niger, minor, oblongus. T.

490. *Raphanistrum*. filiquis teretibus articulatis, lævibus unilocularibus. RADIS SAUVAGE. RAPISTRE. *Raphanistrum* filiqua articulata glabra majore & minore. r. fl albo. r. segetum. T.

BUNIAS. *Silicula* decidua, tetraëdra, angulis inæqualibus acuminatis muricata.

491. *Erucago*. filiculis tetragonis, angulis bicristatis. MASSE DU BEDEAU. *Erucago* segetum. T.

492. *Cakile*. filiculis ovatis, lævibus, ancipitibus. ROQUETTE DE MER. *Cakile* maritima ampliore (angustiore) folio. T.

ISATIS. *Siliqua* lanceolata, unilocularis, r. sperma, decidua, bivalvis: valvulis navicularibus.

493. *Tinctoria*. foliis radicalibus crenatis: caulinis fagittatis, filiculis oblongis. PASTEL. *Isatis* sativa vel latifolia. i. sylvestris vel angustifolia. T.

CLASSIS XVI^a. MONADELPHIA.

Decandria.

GERANIUM. Monogyna. stygmata 5. fructus rostratus, 5-coccus.

494. *Cicutarium*. pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisus obtusis, caule ramoso. BEC DE GRUE CICUTAIRE. *Geranium* cicutæ folio minus & supinum. T.

495. *Moschatum*. pedunculis multifloris, floribus pentandris foliis pinnatis incisus, cotyledonibus pinnatifidis. BEC DE GRUE MUSQUÉ. *Ger.* cicutæ fol. moschatum. T.

496. *Robertianum*. pedunculis bifloris, calycibus pilosis decem angulatis. BEC DE GRUE A ROBERT. *Geran.* robertianum viride . . . rubens. T.

497. *Columbinum*. pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinque partito-multifidis, arillis glabris,

calycibus aristatis. BEC DE GRUE. PIED DE PI-
GEON. Geran. columbinum dissectis foliis , pedi-
culis florum longissimis. T.

498. *Sanguineum*. pedunculis unifloris , foliis quinque-
partitis trifidis orbiculatis. BEC DE GRUE SANGUIN.
Geranium sanguineum maximo flore. T.

Polyandria.

SIDA. *cal.* simplex , angulatus. stylus multipartitus.
capsf. plures , 1-spermæ.

499. *Abutilon*. foliis subrotundo-cordatis indivisis , pe-
dunculis folio brevioribus , capsulis multiloculari-
bus : corniculis bifidis. FAUSSE GUIMAUVE. Abu-
tilon. T.

ALTHÆA. *cal.* duplex : exterior 9-fidus. arilli plurimi ,
monospermi.

500. *Officinalis*. foliis simplicibus tomentosis. GUIMAU-
VE. Althæa dioscoridis & plinii. T.

ALCEA. *cal.* duplex : exterior 6-fidus. *arilli* plures mo-
nospermi.

501. *Rosea*. foliis sinuato angulosis. MAUVE ROSE. Mal-
va rosea folio subrotundo. T.

MALVA. *cal.* duplex : exterior 3-phyllus. *arilli* plurimi ,
monospermi.

502. *Rotundifolia*. caule prostrato , foliis cordato-orbi-
culatis obsolete quinquelobis , pedunculis fructife-
ris declinatis. MAUVE A FEUILLES RONDES. Mal-
va vulgaris , flore minore folio rotundo. T.

503. *Sylvestris*. caule erecto herbaceo , foliis septem-
lobatis acutis , pedunculis petiolisque pilosis.
MAUVE SAUVAGE. Malva vulgaris , flore majore ,
folio sinuato. T.

LAVATERA. *cal.* duplex : exterior 3-fidus. *arilli* plu-
rimi monospermi.

504. *Arborea*. caule arboreo , foliis septem angulari-
bus tomentosis plicatis , pedunculis confertis uni-
floris axillaribus. MAUVE EN ARBRE. Althæa ma-
ritima , arborea , veneta. T.

GOSSYPIUM. *cal.* duplex : exterior 3-fidus. *caps.* 4-locularis. *fem.* lana obvoluta.

505. *Herbaceum.* foliis quinquelobis , subtus eglandulosis , caule herbaceo lævi. COTONNIER EN HERBE. Xylon sive gossypium herbaceum. T.

506. *Arboreum.* foliis palmatis : lobis lanceolatis , caule fruticoso. COTONNIER EN ARBRE. Xylon arboreum. T.

HIBISCUS. *cal.* duplex : exterior polyphyllus. *caps.* 5-locularis , polysperma.

507. *Abelmoschus.* foliis subpeltato cordatis septem angularibus serratis , caule hispido. T. KETMIE D'ÉGYPTE. Ketmia ægyptiaca , semine moschato. T.

CLASSIS XVII^a. DIADELPHIA.

Hexandria.

FUMARIA. *cal.* diphyllus. *cor.* ringens. filamenta 2 , membranacea , singula antheris 3.
508. *Officinalis.* pericarpis monospermis racemosis ; caule diffuso. FUMETERRE. Fumaria officinarum & dioscoridis. T.

Octandria.

POLYGALA. *cal.* 5-phyllus : foliolis duobus alæformibus , coloratis , legumen obcordatum , biloculare.
509. *Vulgaris.* floribus cristatis racemosis , caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus , foliis linearilanceolatis. POLYGALE COMMUN. Polygala major. p. vulgaris. T.

Decandria.

SPARTIUM. Stigma longitudinale , supra villosum.

Filamenta gemini adhærentia. *cal.* deorsum productus.

510. *Junceum*. ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. GENET D'ESPAGNE. Gemista juncea. T.

511. *Scorpius*. ramis spinosis patentibus, foliis ovatis. *Gouan*. GENET ÉPINEUX. Gemista spartium spinosum majus, primum, flore luteo . . . secundum, flore pallido . . . tertium, hirsutum. T.

512. *Scoparium*. foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus augulatis. GENET A BALAIS. cyoso gemista scoparia vulgaris, flore luteo. T.

GENISTA. *cal.* bilabiatus : $\frac{2}{3}$. vexillum oblongum à pistillo staminibusque deorsum reflexum.

513. *Tinctoria*. foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. GENET DES TEINTURIERS. Gemista tinctoria germanica. T.

ONONIS. *cal.* 5-partitus : laciniis linearibus. Vexillum striatum. Legumen turgidum, sessile. Filamenta connata absque fissurâ.

514. *Arvensis* floribus racemosis geminatis, foliis ternatis : superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis. ARRETE BŒUF. *Mitis*. Anonis spinis carens purpurea . . . candidis floribus. *Spinosa*. Anonis spinosa flore purpureo . . . fl. albo. T.

515. *Natrix*. pedunculis unifloris aristatis, foliis ternatis viscosis, stipulis integerrimis, caule fruticoso. BUGRANE VISQUEUX. Anonis viscosa spinis carens lutea major. an. non spinosa fl. luteo variegato. an. spinis carens lutea minor. T.

ANTHYLLIS. *cal.* ventricosus. legumen subrotundum, tectum.

516. *Vulneraria*. herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. VULNÉRAIRE RUSTIQUE. Vulneraria rustica. T.

LUPINUS. *cal.* bilabiatus. antheræ 5 oblongæ ; 5 subrotundæ. legumen coriaceum.

517. *Varius*. calycibus semiverticillatis appendiculatis : labio superiore bifido ; inferiore subtridentato. LUPIN. *Lupinus sylvestris*, flore purpureo , semine rotundo vario. T.
- PHASEOLUS. *Carina* cum staminibus styloque spiralliter tortis.
518. *Vulgaris*. L. T. caule volubili , floribus racemosis geminis , bracteis calyce minoribus , leguminibus pendulis. HARICOT COMMUN. *Coccineus*. *Phaseolus puniceo* flore. T.
519. *Nanus*. caule erecto lævi , bracteis calyce majoribus , leguminibus pendulis compressis rugosis. HARICOT NAIN. *Phaseolus minor* siliqua sursum ringente , fructu albo. T.
- PISUM. *Stylus* triangulus , supra carinatus pubescens. *Calycis* laciniae superiores 2 breviores.
520. *Sativum*. petiolis teretibus , stipulis inferne rotundatis crenatis , pedunculis multifloris. POIS DES JARDINS. *Pisum hortense* majus & var. T.
521. *Ochrus*. petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis , pedunculis unifloris. POIS OCRE. *Ochrus* folio integro , capræolos emittente , semine subluteo . . . pullo . . . atro. T.
- OROBUS. *Stylus* linearis. *cal.* basi obtusus : laciniiis superioribus profundioribus , brevioribus.
522. *Vernus*. foliis pinnatis ovatis , stipulis semisagittatis integerrimis , caule simplici. OROBE PRINTANIER. *Orobus sylvaticus* purpureus vernus. T.
- LATHYRUS. *Stylus* planus , supra villosus , superne latior. *cal.* laciniae superiores 2 breviores.
523. *Cicera*. pedunculis unifloris , cirrhis diphyllis , leguminibus ovatis compressis : dorso canaliculatis. GESSE CICEROLE. *Lathyrus sativus* , flore purpureo. T.
524. *Sativus*. pedunculis unifloris , cirrhis diphyllis tetraphyllisque , leguminibus ovatis compressis dorso bimarginatis. GESSE CULTIVÉE. *Lathyrus sativus* , flore fructuque albo. T.

525. *Tuberosus*. pedunculis multifloris , cirrhis diphyllis , foliis lanceolatis , leguminibus hirsutis , seminibus scabris. GESSE TUBEREUSE. ANOTTE. GLAND DE TERRE. Lath. arvensis repens tuberosus. T.

VICIA. *Stigma* latere inferiore transverse barbatum.

526. *Sativa*. leguminibus sessilibus subbinatis erectis , foliis retusis , stipulis notatis. VESCE CULTIVÉE. Vicia sativa , vulgaris , semine nigro. Vicia sativa alba. Nigra semine rotundo nigro. v. vulgaris , acutius folio , semine parvo nigro. T.

527. *Faba*. caule erecto , petiolis absque cirrhis. FEVE DES MARAIS. Faba rotunda oblonga. T.

ERVUM. *cal.* 5-partitus , longitudine corollæ.

528. *Lens*. pedunculis subbifloris , seminibus compressis convexis. LENTILLE. Lens vulgaris , semine subrotundo. T.

529. *Ervilia*. germinibus undato-plicatis , foliis imparipinnatis. ERS. Ervum verum. T.

CICER. *cal.* 5-partitus , longitudine corollæ : laciniiis superioribus vexillo incumbentibus , legumen rhombeum , turgidum , dispermum.

530. *Arietinum*. foliolis serratis. POIS CHICHE. Cicer sativum flore candido & cæt. spec. T.

CYTISUS. *cal.* 2-labiatus : $\frac{2}{3}$. legumen basi attenuatum.

531. *Laburnum*. racemis simplicibus pendulis , foliolis ovato-oblongis. CYTISE DES ALPES. FAUX ÉBENIER. Cytisus alpinus latifolius , flore racemoso pendulo. T.

COLUTHEA. *cal.* 5-fidus. Legumen inflatum , basi superiore dehiscens.

532. *Arborescens*. Arborea foliolis obcordatis. BAGUENAUDIER.

GLYCYRRHIZA. *cal.* bilabiatus : $\frac{3}{1}$. legumen ovatum , compressum.

533. *Glabra*. leguminibus glabris, stipulis nullis, foliolo impari petiolato. REGLISSE. Glycyrrhiza glabra & germanica radice repente. T.

CORONILLA. *cal.* bilabiatus : $\frac{2}{3}$. dentibus superiori-

bus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* isthmis interceptum.

534. *Emerus*. fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calyce triplo longioribus caule angulato. SECURIDACA DES JARDINIERS. Emerus. T.

ORNITHOPUS. *Legumen*. articulatum, teres, armatum.

535. *Scorpioides*. foliis ternatis subsessilibus : impari maximo. PIED D'OISEAU. Ornithopodium portulacæ folio T.

HEDYSARUM. *cor.* carina transverse obtusa. *Legumen* articulis monospermis.

536. *Coronarum*. foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis rectis, caule diffuso. SAIN-FOIN D'ESPAGNE. Hedyсарum clypeatum, flore suaviter rubente. T.

537. *Onobrychis*. foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calycem æquantibus caule elongato. SAINFOIN. ESPARCETTE. Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato, major. T.

INDIGOFERA. *cal.* patens. *corollæ* carina utrinque calcari subulato patulo ! *legumen* lineare.

538. *Tindoria*. foliis pinnatis obovatis, racemis brevioribus, caule suffruticoso. INDIGO. Anonis americana, folio latiori subrotundo. T.

GALEGA. *cal.* dentibus subulatis, subæqualibus. *Legumen* striis obliquis, seminibus interjectis.

539. *Officinalis*. leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. RUE DE CHEVRE. Galega vulgaris floribus cæruleis. T.

ASTRAGALUS. *Legumen* biloculare , gibbum.

540. *Glycyphyllos*. caulescens prostratus , leguminibus subtriquetris arcuatis , foliis ovalibus pedunculo longioribus. ASTRAGALE. FAUX-REGLISSE. Astragalus luteus , perennis , procumbens , vulgaris , sine sylvestris. T.

541. *Monspessulanus*. L. T. acaulis , scapis declinatis , longitudine foliorum , leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris. ASTRAGALE DE MONTPELLIER.

542. *Tragacantha*. caudice arborecente , petiolis spinulentibus. BARBE DE RENARD. Tragacantha Massiliensis. T.

PSORALEA. *calyx* punctis callosis adpersus , longitudine leguminis monospermi.

543. *Bituminosa*. foliis omnibus ternatis , foliolis lanceolatis , petiolis lævibus , floribus capitatis. TREFLE PUANT. Trifolium bitumen redolens. T.

TRIFOLIUM. *Flores* subcapitati. *legumen* vix calyce longius non dehiscens , deciduum.

544. *Melilotus cærulæa*. racemis ovatis , leguminibus seminudis mucronatis caule erecto , spicis oblongis. LOTIER ODORANT. Melilotus major , odorata , flore violaceo. T.

545. *Melilotus officinalis*. leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis , caule erecto. MELILOT DES BOUTIQUES. Melilotus officinarum germaniæ. m. o. g. flore albo. m. vulgaris , altissima frutescens , fl. albo . . . fl. luteo. T.

546. *Melilotus italica*. leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis obtusis , caule erecto , foliolis integris. MELILOT D'ITALIE. Melilotus italica folliculis rotundis. T.

547. *Repens*. capitulis umbellaribus , leguminibus tetraspermis , caule repente. TREFLE BLANC RAMPANT. Trifolium pratense album. T.

548. *Pratense*. spicis globosis subvillosis , cinctis stipulis oppositis membranaceis , corollis monopetalis.

TREFLE DES PRÉS. *Trifolium pratense* flore monopetalo. T.

549. *Arvense*. spicis villosis ovalibus , dentibus calycinis fetaceis villosis æqualibus. TREFLE DES CHAMPS. PIED DE LIEVRE. *Trifolium arvense* , humile , spicatum , seu lagopus. T.

LOTUS. *legumen*. cylindricum , strictum. *Alæ* sursum longitudinaliter conniventes. *cal.* tubulosus.

550. *Hirsutus* Capitulis subrotundis , caule erecto hirsuto , leguminibus ovatis. LOTIER HÉMORRHOÏDAL. Lotus pentaphyllos filiquosus villosus. T.

TRIGONELLA. *Vexillum* & *alæ* subæquales , patentes , forma corollæ tripetalæ.

551. *Fœnum græcum*. leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis , caule erecto. FÈNU GREC. Fœnum græcum sativum. f. g. sylvestre. T.

MEDICAGO. *Legumen* compressum , côchleatum. *Carina* corollæ à vexillo deflectens.

552. *Arborea*. leguminibus lunatis margine integerrimis , caule arboreo. LUZERNE EN ARBRE. Medicago trifolia frutescens incana. T.

553. *Sativa*. pedunculis racemosis , leguminibus contortis , caule erecto glabro. LUZERNE CULTIVÉE. Medica major , erectior , floribus purpureis. T.

CLASSIS XVIII^a. POLYADELPHIA.

Icosandria.

CITRUS. *cal.* 5-fidus. *petala* 5 oblonga. *antheræ* 20 , filamentis connatis in varia corpora. *bacca* 9-locularis.

554. *Medica*. petiolis linearibus. CITRONNIER. LIMONNIER. Citreum vulgare. Limon vulgaris. T.

555. *Aurantium*. petiolis alatis , foliis acuminatis. *ORANGER*. *Aurantium* acri medulla , vulgare. *Aurantium* dulci medulla , vulgare. T.

HYPERICUM. *cal.* 5-partitus. petala 5. *filamenta* multa , in 5 phalanges basi connata. *capsula*.

556. *Balearicum*. floribus pentagynis , caule fruticoso , foliis ramisque cicatrifatis. *MILLEPERTUIS DE MAIORQUE*.

557. *Androsæmum*. floribus trigynis , fructibus baccatis , caule fruticoso ancipiti. *TOUTESAINE*. *Androsæmum* maximum frutescens. T.

558. *Perforatum*. floribus trigynis , caule ancipiti , foliis obtusis , pellucido punctatis. *MILLE PERTUIS COMMUN*. *Hypericum* vulgare. T.

CLASSIS XIX^a. SYNGENESIA.

Polygamia æqualis.

TRAGOPOGON. *Receptaculum* nudum. *cal.* simplex. *pappus*. plumosus.

559. *Pratense*. calycibus corollæ radius æquantibus foliis integris strictis. *SALSIFIX DES PRÉS*. *BARBE DE BOUC*. *Tragopogon* pratense luteum majus. minus. T.

560. *Porrifolium*. calycibus corollæ radio longioribus , foliis integris strictis , pedunculis superne incrassatis. *SALSIFIX DES JARDINS*. *Tragopogon* purpureo cærulæum , porri folio , quod artifi vulgò. T.

SCORZONERA. *Receptaculum* nudum. *pappus* plumosus. *calyx* imbricatus squamis margine scariosis.

561. *Hispanica*. caule ramoso , foliis amplexicaulibus integris , ferrulatis. *SCORSONERE D'ESPAGNE*. *Scorzonera* latifolia sinuata. T.

SONCHUS. *Receptaculum* nudum. *calyx* imbricatus ventricosus. *pappus* pilosus.

562. *Oleraceus*. pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *LAITRON DES JARDINS*. Sonchus lævis laciniatus, latifolius . . . angustifolius. f. lævis minor, paucioribus laciniis. f. asper non laciniatus . . . laciniatus . . . folio dentis leonis. T.

LACTUCA. *recept.* nudum. *calyx* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *pappus* simplex, stipitatus. *sem.* lævia.

563. *Sativa*. L. T. foliis rotundatis, caulinis cordatis, caule corymbofo. *LAITUE DES JARDINS*. Lactuca capitata &c. T.

564. *Virosa*. foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *LAITUE VIREUSE*. Lactuca sylvestris odore viroso. T.

CHONDRILLA. *recept.* nudum. *cal.* calyculatus. *pappus* simplex, stipitatus. *flosculi* multiplici serie. *sem.* muricata.

565. *Juncea*. foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *CONDRIFFE VISQUEUSE*. chondrilla juncea viscosa arvensis. T.

LEONTODON. *Receptaculum* nudum. *cal.* imbricatus squamis laxiusculis. *pappus* plumosus.

566. *Taraxacum*. calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *PISSENLIT. DENT-DE-LION*. Dens leonis latiore (rotundiore) tenuissimo folio. T.

HIERACIUM. *Recept.* nudum. *cal.* imbricatus ovatus. *pappus* simplex, sessilis.

567. *Pilosella*. foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *PILOSELLE. OREILLE DE SOURIS*. Dens leonis, qui pilosella officinarum. T.

568. *Murorum*. caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori. *PULMONAIRE DES FRANÇOIS*. Hieracium murorum, folio pilosissimo . . . minus pilosum. T.

LAPSANA. *recept.* nudum. *cal.* calyculatus squamis sin-
gulis interioribus canaliculatis.

569. *Communis.* Calycibus fructus angulatis, pedunculis
tenuibus ramosissimis. HERBE AUX MAMMELLONS.
Lapsana. T.

CATANANCHE. *recept.* paleaceum. *cal.* imbricatus.
pappus aristatus pappo 5-feto.

570. *Cærulea.* squamis calycinis inferioribus ovatis. CU-
PIDONE. Catanance quorundam. c. flore pleno,
cæruleo. T.

CICHORIUM. *Receptaculum* subpaleaceum. *calyx* ca-
lyculatus. *pappus* sub-5-dentatus, ob-
solete pilosus.

571. *Intybus.* floribus geminis sessilibus; foliis runcina-
tatis. CHICORÉE SAUVAGE. Cichorium sylvestre,
seu officinarum . . . flore albo. T.

572. *Endivia.* floribus solitariis pedunculatis, foliis in-
tegris crenatis. CHICORÉE DES JARDINS. Cicho-
rium latifolium, seu endivia vulgaris. T.

SCOLYMUS. *recept.* paleaceum. *cal.* imbricatus, spi-
nosus, *pappus* nullus.

573. *Hispanicus.* floribus congestis. ÉPINE JAUNE. Sco-
lymus chrysanthemus. T.

ARCTIUM. *cal.* globosus: squamis apice hamis in-
flexis.

574. *Lappa.* foliis cordatis inermibus petiolatis. BAR-
DANE COMMUNE. Lappa major, seu arctium diof-
coridis. T.

SERRATULA. *cal.* subcylindricus, imbricatus mu-
tilus.

575. *Tinctoria.* foliis lyrato-pinnatifidis: pinna termi-
nali maxima, flosculis conformibus. SARRETTE
DES TEINTURIERS. Jacea nemorensis, quæ serra-
tula vulgò. T.

576. *Arvensis.* foliis dentatis spinosis. SARRETTE DES
CHAMPS. CHARDON HÉMORRHOÏDAL. Cirsium ar-
vense, Sonchi folio, radice repente, flore pur-
purascente (albo) T.

CARDUUS.

CARDUUS. *cal.* ovatus , imbricatus squamis spinosis.
recept. pilosum.

577. *Marianus.* foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis , calycibus aphyllis : spinis canaliculatis duplicato-spinosis. CHARDON MARIÉ. Carduus albis maculis notatus vulgaris. T.

ONOPORDUM. *Receptaculum* favosum. *cal.* squamæ mucronatæ.

578. *Acanthium.* calycibus squarosis , squamis patentibus , foliis ovato-oblongis sinuatis. PET D'ANE. CHARDON A FEUILLES D'ACANTHE. Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris. T.

CYNARA. *cal.* dilatatus , imbricatus squamis carnosis , emarginatis cum acumine.

579. *Scolymus.* foliis subspinosis pinnatis indivisisque , calycinis squamis ovatis. ARTICHAUD. Cynara hortensis foliis non aculeatis . . . fol. aculeatis. cynara sylvestris latifolia. T.

580. *Cardunculus.* foliis spinosis : omnibus pinnatifidis , calycinis squamis ovatis. CARDON D'ESPAGNE. Cynara spinosa cujus pediculi esitantur. T.

CARLINA. *cal.* radiatus squamis marginalibus longis , coloratis.

581. *Acaulis.* caule unifloro flore breviorē. CARLINE SANS TIGE. Carlina acaulis magno flore albo. T.

CARTHAMUS. *cal.* ovatus , imbricatus squamis apice subovato foliaceis.

582. *Tinctorius.* foliis ovatis integris ferrato-aculeatis. CARTHAME. SAFFRAN BATARD. Cnicus sativus & carthamus officinarum. T.

CACALIA. *recept.* nudum. *pappus* pilosus. *cal.* cylindricus oblongus , basi tantum subcalyculatus.

583. *Alpina.* foliis reniformi-cordatis acutis denticulatis , calycibus subtrifloris. CACALIA DES ALPES. Cacalia foliis crassis & hirsutis. c. foliis cutaneis , acutioribus & glabris. T.

EUPATORIUM. *recept.* nudum. *pappus* plumosus.

Calyx imbricatus, oblongus. *stylus* semibifidus, longus.

584. *Cannabinum*. L. T. foliis digitatis. EUPATOIRE A FEUILLES DE CHANVRE.

SANTOLINA. *recept.* paleaceum. *pappus* nullus. *calyx* imbricatus, hæmisphæricus.

585. *Chamæ cyparissus*. pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. GARDE ROBE. Santolina foliis teretibus. T.

ATHANASIA. *recept.* palaceum. *pappus* palaceus, brevissimus. *cal.* imbricatus.

586. *Maritima*. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis crenatis obtusis tomentosis. IMMORTELLE MARITIME. Gnaphalium maritimum. T.

Polygamia superflua.

TANACETUM. *recept.* nudum. *pappus* submarginatus. *cal.* imbricatus, hæmisphæricus. *cor.* radii obsoletæ, 3-fidæ (interdum nullæ omnesque flosculi hermaphroditi.)

587. *Vulgare*. foliis bipinnatis incisiferratis. TANAISIE COMMUNE. Tanacetum vulgare luteum. T.

588. *Balsamita*. foliis ovatis integris ferratis. MENTHE-COQ. Tanacetum hortense foliis & odore menthæ. T.

ARTEMISIA. *recept.* subvillosum, vel nudiusculum. *pappus* nullus. *cal.* imbricatus squamis rotundatis conniventibus. Corollæ radii nulli.

589. *Abrotanum*. fruticosa, foliis setaceis ramosissimis. AURONE MALE. Abrotanum mas angustifolium. T.

590. *Campestris*. foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. ARMOISE CHAMPETRE. Abrotanum campestre, cauculis rubentibus. T.

591. *Maritima* foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis fœmineis ternis. ABSINTHE MA-

RITIME. *Abinthium seriphium belgicum* ... germanicum ... gallicum. T.

592. *Pontica*. foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. PETITE ABSINTHE. *Abinthium ponticum tenuifolium incanum*. T.

593. *Abinthium*. foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo villosa. GRANDE ABSINTHE. *Abinthium ponticum*, seu romanum officinarum, seu dioscoridis. T.

594. *Vulgaris*. foliis pinnatifidis planis incisissimis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. ARMOISE COMMUNE. *Artemisia vulgaris major*. T.

595. *Dracunculus*. foliis lanceolatis glabris integerrimis. ESTRAGON. *Abrotanum lini folio acriori & odorato*. T.

GNAPHALIUM. *Recept. nudum. pappus plumosus. cal. imbricatus, squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis.*

596. *Stæchas*. fruticosum, foliis linearibus, corymbo composito, ramis virgatis. IMMORTELLE JAUNE. *Elychrysum seu stæchas citrina angustifolia*. T.

597. *Fætidum*. herbaceum, foliis amplexicaulibus integerrimis acutis subtus tomentosis, caule ramoso. IMMORTELLE FÉTIDE. *Elychrysum africanum, fætidissimum, amplissimo folio*. T.

598. *Dioicum*. sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis. PIED-DE-CHAT. *Elychrysum montanum*. T.

CONYZA. *Recept. nudum. pappus simplex. cal. imbricatus, subrotundus. cor. radii trifidæ.*

599. *Squarrosa*. foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymbofo, calycibus squarrosis. CONISE COMMUNE. *Conyza vulgaris major*. T.

ERIGERON. *Recept. nudum. pappus pilosus. cor. radii lineares, angustissimæ.*

600. *Viscosum*. pedunculis unifloris lateralibus , foliis lanceolatis denticulatis basi reflexis , calycibus squarrosis , corollis radiatis. VERGERETIE VISQUEUSE. Virga aurea major , foliis glutinosis & graveolentibus. T.

601. *Graveolens*. foliis sublinearibus integerrimis , ramis lateralibus multifloris. VERGERETIE FÉTIDE. Virga aurea minor , foliis glutinosis & grave olentibus. T.

TUSSILAGO. *Recept.* nudum. *pappus* simplex. *cal.* squamæ æquales , discum æquantes , submembranaceæ.

602. *Farfara*. scapo imbricato unifloro , foliis subcordatis angulatis denticulatis. TUSSILAGE COMMUN. Tussilago vulgaris. T.

603. *Petasites*. Thyrsis ovato , flosculis fœmineis nudis paucis. TUSSILAGE PETASITE. Petasites major & vulgaris T.

SENECIO. *Recept.* nudum. *pappus* simplex. *cal.* cylindricus , calyculatus : squamis apice sphaecelatis.

604. *Vulgaris*. corollis nudis , foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus , floribus sparsis. SENEÇON COMMUN. Senecio vulgaris minor. T.

605. *Abrotanifolius*. corollis radiantibus , foliis pinnato-multifidis linearibus nudis acutis , pedunculis subbifloris. SENEÇON A FEUILLES D'AURONE. Jacobæa foliis ferulaceis , flore minore. T.

606. *Jacobæa*. corollis radiantibus , foliis pinnato-lyratis , laciniis lacinulatis , caule erecto. SENEÇON-JACOBÉE. Jacobæa vulgaris laciniata. T.

ASTER. *Recept.* nudum. *pappus* simplex. *cor.* radii plures 10. *cal.* imbricati squamæ inferiores patulæ.

607. *Tripolium*. foliis lanceolatis integerrimis carnosissimis glabris , ramis inæquatis , floribus corymbosis. ASTER MARITIME BLEU. Aster maritimus palustris , ærulæus , salicis folio. T.

608. *Amellus*. foliis lanceolatis obtusis scabris trinerviis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis *ASTER*. *ÆIL DE CHRIST*. Aster atticus cærulæus vulgaris. T.

SOLIDAGO. Recept. nudum. pappus simplex. cor radii circiter 5. cal. squamæ imbricatæ clausæ.

609. *Canadensis*. paniculato corymbosa, racemis recurvatis, floribus adscendentibus, foliis trinerviis subserratis scabris. *VERGE D'OR DU CANADA*. Virga aurea angustifolia, panicula speciosa, *Canadensis*. T.

610. *Virga aurea*. caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *VERGE D'OR COMMUNE*. Virga aurea latifolia ferrata . . v. a. l. vulgaris. T.

INULA. Recept. nudum. pappus simplex. antheræ basi in setas duas desinentes.

611. *Helenium*. foliis amplexicaulibus ovatis rugosis : subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *AUNÉE ENULA CAMPANA*. Aster omnium maximus, *helenium* dictus. T.

612. *Dysenterica*. foliis amplexicaulibus cordato-oblongis subtomentosis, caule villoso paniculato, squamis calycinis setaceis. *AUNÉE ANTI-DYSSENTÉRIQUE*. Aster pratensis autumnalis, conysæ folio. T.

613. *Crithmifolia*. foliis linearibus carnosissimis tricuspidatis. *LIMBARDE*. Aster maritimus, folio tereti, crasso tridentato. T.

ARNICA. Receptac. nudum. pappus simplex. corollulæ radii filamentis 5 absque antheris.

614. *Montana*. foliis ovatis integris : caulinis geminis oppositis. *BETOINE DE MONTAGNE*. Doronicum plantaginifolium alterum. T.

DORONICUM. Recept. nudum. pappus simplex. cal. squamæ duplicis ordinis æquales, disco longiores. sem. radii nuda pappoque destituta.

615. *Pardalianches*. foliis cordatis obtusis denticulatis : radicalibus petiolatis ; caulinis amplexicaulibus. *DORONIC*. *Doronicum* maximum foliis caulem amplexantibus. T.
- BELLIS. *Recept.* nudum, conicum. *pappus* nullus. *cal.* hemisphæricus : squamis æqualibus. *semina* obovata.
616. *Perennis*. scapo nudo. *PAQUERETTE VIVACE*. Bellis sylvestris minor, &c. T.
- TAGETES. *Recept.* nudum. *pappus* aristis 5, erectis. *cal.* 1-phyllus, 5-dentatus, tubulosus. flosculi radii 5 perfidentes.
617. *Patula*. canle subdiviso patulo. *ÆILLET D'INDE*. Tagetes indicus minor multiplicato flore. T.
618. *Erecta*. caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris. *GRAND ÆILLET D'INDE*. Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato. T.
- CHRYSANthemum. *Receptaculum* nudum. *pappus* nullus. *cal.* hemisphæricus, imbricatus : squamis marginalibus membranaceis.
619. *Leucanthemum*. floribus amplexicaulibus oblongis : superne ferratis, inferne dentatis. *CHRYSANthemE COMMUN*. *Leucanthemum* vulgare. T.
- MATRICARIA. *Recept.* nudum. *pappus* nullus. *cal.* hemisphæricus, imbricatus : marginalibus solidis, acutiusculis.
620. *Parthenium*. foliis compositis planis : foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. *MATRICAIRE ORDINAIRE*. *Matricaria* vulgaris, seu sativa. T.
621. *Chamomilla*. *Receptaculis* conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *CAMOMILLE COMMUNE*. *Chamæmelum* vulgare, seu *leucanthemum* dioscoridis. T.
- ANTHEMIS. *Receptaculum* paleaceum. *pappus* nullus. *cal.* hemisphæricus, subæqualis. flosculi radii plures quàm 5.
622. *Nobilis*. foliis pinnato-compositis linearibus acutis

subvillosis. *CAMOMILLE ROMAINE*. Chamæmelum nobile , seu leucanthemum odoratus. T.

ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *pappus* nullus. *cal.* ovatus , imbricatus. *flosculi* radii circiter 4.

623. *Ageratum*. foliis lanceolatis obtusis acute serratis. *ACHILLIERE JAUNE ODORANTE*. Ptarmica lutea suaveolens. T.

624. *Ptarmica*. foliis lanceolatis acuminatis argute serratis. *ACHILLIERE STERNUTATOIRE*. *HERBE A ÉTERNUER*. Ptarmica vulgaris , folio loego , serrato , flore albo. T.

625. *Millefolium*. foliis bipinnatis nudis : laciniis linearibus dentatis , caulibus superne sulcatis. *ACHILLIERE*. *MILLEFEUILLE*. Millefolium vulgare album . . . purpureum. T.

626. *Odorata*. foliis bipinnatis ovalibus nudiusculis , corymbis fastigiatis confertis. *PETITE MILLEFEUILLE ODORANTE*. Millefolium odoratum , Monspelienfe. T.

Polygamia frustranea.

HELIANTHUS. *Recept.* paleaceum , planum. *pappus* diphyllus. *cal.* imbricatus , subsquarrosus.

627. *Annuus*. foliis omnibus cordato-trinervatis , pedunculis incrassatis , floribus cernuis. *SOLEIL ANNUEL*. Corona solis. T.

628. *Multiflorus*. foliis inferioribus cordatis trinervatis : superioribus ovatis. *SOLEIL VIVACE*. Corona solis ramosa. T.

629. *Tuberosus*. foliis ovato-cordatis triplinervis. *SOLEIL TOPINAMBOURG*. Corona solis parvo flore , tuberosa radice. T.

CENTAUREA. *Recept.* setosum. *pappus* simplex. *cor.* radii infundibuliformes , longiores , irregulares.

630. *Cyanus*. calycibus ferratis , foliis linearibus integerrimis : infimis dentatis. BLUET. BARBOT. AUBIFOIN. CASSE-LUNETTE. *Cyanus* segetum flore cæruleo . . . albo. *Cyanus hortensis* fl. simplici . . . duplici. T.
631. *Jacea*. calycibus scariosis laceris , foliis lanceolatis : radicalibus sinuato dentatis , ramis angulatis. JACÉE DES PRÉS. *Jacea nigra pratensis latifolia*. T.
632. *Benedicta*. calycibus duplicato-spinosis lanatis involucratis , foliis semi-decurrentibus denticulato-spinosis. CHARDON BÉNI. *Carduus benedictus*. T.
633. *Calcitrapa*. calycibus subduplicato-spinosis sessilibus , foliis pinnatifidis linearibus dentatis , caule piloso. CHAUSSETRAPE ÉTOILÉE. *Carduus stellatus* , sive *calcitrapa*. T.

Polygamia necessaria.

CALENDULA. *Recept.* nudum. *pappus* nullus. *cal.* polyphyllus æqualis. *sem.* disci membranacea.

634. *Arvensis*. feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis : extimis erectis protensis. SOUCI DES CHAMPS. *Caltha arvensis*. T.
635. *Officinalis*. feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. SOUCI DES JARDINS. *Caltha vulgaris*. T.

FILAGO. *Recept.* nudum. *pappus* nullus. *calyx* imbricatus. *flosculi* fœminei inter squamas calycis locati.

636. *Germanica*. panicula dichotoma , floribus rotundatis axillaribus hirsutis ; foliis acutis. COTONNIÈRE COMMUNE. *Filago* seu *impia*. T.

Monogamia.

LOBELIA. *cal.* 5-fidus. *cor.* 1-petala , irregularis. *caps.* infera , 2. f. 3-locularis.

637. *Siphilitica*. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis subserratis, calycum sinibus reflexis. CARDINALE BLEUE.

VIOLA. *cal* 5-phyllus. *cor.* 5-petala, irregularis, postice cornuta. *capsf.* supera, 3-valvis, 1-locularis.

638. *Odorata*. acaulis, foliis cordatis, stolonibus repantibus. VIOLETTE ODORANTE. Viola martia purpurea (vel alba) flore simplici, odoro. T.

639. *Tricolor*. caule triquetro diffuso, foliis oblongis incis, stipulis pinnatifidis. VIOLETTE PENSÉE.

IMPATIENS. *cal.* 2-phyllus. *cor.* 5-petala, irregularis, nectario cucullato. *capsf.* supera, 5-valvis.

640. *Balsamina*. pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis: superioribus alternis, nectariis flore brevioribus. BALSAMINE DES JARDINS. Balsamina fœmina. T.

CLASSIS XX^a. GYNANDRIA.

Diandria.

ORCHIS. *Nectarium* coniforme pone florem.

641. *Bifolia*. bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus.

ORCHIS BLANC. Orchis alba bifolia (& trifolia) minor, calcari oblongo. T.

642. *Morio*. bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. SATIRION FEMELLE. Orchis morio, fœmina. T.

643. *Mascula*. bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. ORCHIS MALE. Orchis morio; mas foliis inaculatis. . . non maculatis. T.

644. *Militaris*. bulbis indivisis, nectarii labio 5-fido

punctis scabro : cornu obtuso , petalis confluentibus. ORCHIS MILITAIRE. *Orchis militaris* major. T.

SATYRIUM. *Nectarium* scrotiforme. f. inflato-didymum pone florem.

645. *Hircinum*. bulbis indivisis , foliis lanceolatis , nectarii labio trifido. SATIRION A ODEUR DE BOUC. *Orchis barbata* odore hirci , brevior latioreque folio. T.

OPHRYS. *Nectarium* subtus subcarinatum.

646. *Ovata*. bulbo fibroso , caule bifolio , foliis ovatis , Nectarii labio bifido. OPHRIS DOUBLE FEUILLE. *Ophrys bifolia*. T.

SERAPIAS. *Nectarium* ovatum gibbum , labio ovato.

647. *Latifolia*. bulbis fibrosis , foliis ovatis amplexicaulibus , floribus pendulis. HELLEBORINE A FEUILLES LARGES. *Helleborine* , latifolia , montana. T.

Pentandria.

PASSIFLORA. Trigyna. cal. 5-phyllus. *Nectarium* corona. bacca pedicellata.

648. *Cærulea*. foliis palmatis integerrimis. FLEUR DE LA PASSION. *Granadilla polyphyllus* , fructu ovato. T.

Hexandria.

ARISTOLOCHIA. Hexagyna. cal. o. cor. 1-petala , lingulata , integra. caps. 6-locularis , infera.

649. *Pistolochia*. foliis cordatis crenulatis subtus reticulatis petiolatis , floribus solitariis. PISTOLOCHE. *Aristolochia pistolochia* dicta. T.

650. *Rotunda*. foliis cordatis subsessilibus obtusis , caule infirmo , floribus solitariis. ARISTOLOCHE RONDE. *Aristolochia rotunda* , flore ex purpura nigro . . . flore ex albo purpurascente. T.

651. *Longa*. foliis cordatis petiolatis integerrimis obtu-

fusculis , caule infirmo , floribus solitariis. ARISTOLOCHE LONGUE. Aristolochia longa vera. T.

652. *Clematitis*. foliis cordatis (petiolatis) caule erecto , floribus axillaribus confertis. ARISTOLOCHE CLÉMATITE. Aristolochia clematitis recta. T.

Dodecandria.

CYTINUS. Monogyna. *cal.* 4-fidus , superus. *cor.* o. *antheræ* 16 , sessiles. *bacca* 8-locularis , polysperma.

653. *Hypocistis*. HYPOCISTE. Hypocistis flore luteo. T.

Polyandria.

ARUM. *Spatha* monophylla , cucullata. *Spadix* supra nudus , inferne scæmineus , medio stamineus.

654. *Dracunculus*. foliis pedatis : foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiorem. SERPENTAIRE. Dracunculus polyphyllus. T.

655. *Maculatum*. acaule , foliis hastatis integerrimis , spadice clavato. PIED DE VEAU. Arum vulgare non maculatum . . . maculis candidis . . . nigris. T.

ZOSTEKA. *Spadix* linearis , altero latere fructifero. *cal.* o. *cor.* o. *stam.* alterna. *sem.* solitaria , alterna.

656. *Marina*. pericarpis sessilibus. ALGUE MARINE. Alga angustifolia vitriariorum. T.

CLASSIS XXI^a. MONŒCIA.

Diandria.

LEMNA Masc. *cal.* 1-phyllus. *cor.* nulla.
Fem. *cal.* 1-phyllus. *cor.* o. *styl.* 1.
caps. 1-locularis.

657. *Minor.* foliis sessilibus , utrinque planiusculis , radicibus foliariis. PETITE LENTILLE D'EAU. Lenticula palustris , vulgaris. T.

Triandria.

TYPHA. Masc. *Amentum* cylindricum. *cal.* obsoletus , triphyllus. *cor.* o.

Fem. *Amentum* cylindricum , infra masculos. *cal.* capillo villosa. *cor.* o. *sem.* 1 , insidens pappo capillari.

658. *Latifolia.* foliis subensiformibus , spica mascula femineaque approximatis. MASSETTE A FEUILLES LARGES. Typha palustris major. T.

SPARGANIUM. Masc. *Amentum* subrotundum. *cal.* 3-phyllus. *cor.* o.

Fem. *Amentum* subrotundum. *cal.* 3-phyllus. *cor.* o. *stigma* bifidum. *Drupa* exsucca , isperma.

659. *Erectum.* foliis erectis triquetris. RUBAN D'EAU REDRESSÉ. Sparganium ramosum . . . non ramosum. T.

ZEA. Masc. In distinctis spicis. *cal.* gluma 2-flora mutica. *or.* gluma mutica.

Fem. *Cal.* gluma bivalvis. *cor.* gluma 2-valvis. *stylus* 1 , filiformis , pendulus. *sem.* folitaria , receptaculo oblongo immersa.

660. *Mays.* BLEU DE TURQUIE. MAYS. Mays granis aureis. T.

COIX. Masc. in spicis remotis. *cal.* gluma 2-flora , mutica. *cor.* gluma mutica.

Fem. *cal.* gluma 2-flora. *cor.* gluma mutica. *stylus* 2 partitus. *sem.* calyce ossificato tectum.

661. *Lacryma.* feminibus ovatis. LARME DE JOB. Lacryma Job. T.

Tetrandria.

BETULA. Masc. *cal.* 1-phyllus, 3-fidus, 3-florus.
cor. 4-partita.

Fem. *cal.* 1-phyllus, sub 3-fidus, 2-florus.
sem. utrinque membrana alata.

662. *Alnus.* pedunculis ramosis. AULNE. BOULEAU-
VERGNE. *Alnus* rotundifolia glutinosa viridis. T.

BUXUS. Masc. *Cal.* 3-phyllus. *pet.* 2. *germinis* rudimentum.

Fem. *Cal.* 4-phyllus. *petala* 3. *styli* 3. *caps.* 3-rostris, 3-locularis. *sem.* 2.

663. *Sempervirens.* BUIS. *Arborescens* L. T. *suffruticosus.*
Buxus foliis rotundioribus. T.

URTICA. Masc. *Cal.* 4-phyllus. *cor.* o. nectarium centrale cyathiforme.

Fem. *Cal.* 2-valvis. *cor.* o. *sem.* 1, nitidum.

664. *Pilulifera.* foliis oppositis ovatis ferratis, amentis fructiferis globosis. ORTIE A PILULE. *Urtica* prima dioscoridis, femine lini. T.

665. *Urens.* foliis oppositis ovalibus. PETITE ORTIE. *Urtica* urens minor. T.

666. *Dioica.* foliis oppositis cordatis, racemis geminis. GRANDE ORTIE. *Urtica* urens maxima. T.

MORUS. Masc. *Cal.* 4-partitus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 4-phyllus. *cor.* o. *styli* 2. *cal.* baccatus. *sem.* 1.

667. *Alba.* foliis oblique cordatis lævibus. MURIER BLANC. *Morus* fructu albo. T.

668. *Nigra.* foliis cordatis scabris. MURIER NOIR. *Morus* fructu nigro. T.

Pentandria.

XANTHIUM. Masc. *Cal.* communis imbricatus. *cor.* 1-petalæ, 5-fidæ, infundibuliformes. *recept.* palaceum.

Fem. *Cal.* involucrium diphyllum, 2-florum. *cor.* o. *drupa* sicca, muricata, 2-fida. *nucleus* 2-locularis.

669. *Strumarium*. caule inermi, foliis cordatis trineratis. GLOUTERON. *Xanthium*. T.

AMARANTHUS. Masc. *Cal.* 3-f. 5-phyllus. *cor.* o. *stam.* 3-f. 5.

Fem. *Cal.* maris. *cor.* o. *styli* 3. *caps.* 1-locularis, circumscissa *sem.* 1.

670. *Tricolor*. glomerulis triandris axillaribus subrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolato-ovatis coloratis. AMARANTHE A TROIS COULEURS. *Amaranthus* folio variegato, colore hilariori, qui fœmina . . . colore obscuriori sive mas. T.

671. *Blitum*. glomerulis lateralibus: floribus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. AMARANTHE BLETTE. *Amaranthus* sylvestris & vulgaris. T.

672. *Caudatus*. racemis pentandris decompositis cylindricis pendulis longissimis. AMARANTHE A QUEUE. *Amaranthus* maximus. T.

Polyandria.

POTERIUM. Masc. *Cal.* 4-phyllus. *cor.* 4-partita. *stam.* 30-50.

Fem. *Cal.* 4-phyllus. *cor.* 4-partita. *pist.* 2. *bacca* è tubo corollæ indurato.

673. *Sanguisorba*. inerme, caulibus subangulosis. PETITE PIMPRENELLE. *Pimprinella* *sanguisorba* minor hirsuta, &c. T.

QUERCUS. Masc. *Cal.* 5-fidus ferè. *cor.* o. *stam.* 5-10. Fem. *Cal.* 1-phyllus, integerrimus scaber. *cor.* o. *styli* 2-5. *sem.* 1, ovatum.

674. *Ilex*. foliis ovato-oblongis indivisis ferratisque sub-

tusincanis, cortice integro. CHENE VERD. YEUSE.
Ilex oblongo ferrato folio . . . angusto non ferra-
to . . . rotundiore. T.

675. *Suber*. foliis ovato-oblongis indivisis ferratis subtus
tomentosis; cortice rimoso fungoso. LIEGE. *Suber*
latifolium, perpetuò virens. T.

676. *Coccifera*. foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis
utrinque glabris. CHENE DU KERMÉS. Ilex aculea-
ta cocciglandifera. T.

677. *Robur*. foliis deciduis oblongis superne latioribus :
Sinubus acutioribus : angulis obtusis. CHENE
BLANC. *Quercus latifolia* mas quæ brevi pediculo.
Quercus cum longo pediculo. *Quercus* foliis molli
lanugine pubescentibus, &c. T.

JUGLANS. Masc. *Cal.* 1-phyllus; squammiformis. *cor.*
6-partita, *flam.* 18.

Fem. *Cal.* 4-fidus, superus. *cor.* 4-par-
tita. *styli* 2. *drupa* nucleo sulcato.

678. *Régia*. foliolis ovalibus glabris subserratis, sub-
æqualibus. NOYER. *Nux juglans regia vulgaris*,
&c. T.

FAGUS. Masc. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *cor.* 0.
flam. 12.

Fem. *Cal.* 4-dentatus. *cor.* 0. *styli* 3. *caps.*
(*calyx* antea) muricata 4-valvis. *sem.*
2.

679. *Castanea*. foliis lanceolatis acuminato serratis sub-
tus nudis CHATAIGNER. *Castanea sativa*. T.

680. *Sylvatica*. foliis ovatis obsolete serratis. HETRE.
Fagus. T.

CARPINUS. Masc. *Cal.* 1-phyllus : squama ciliata.
cor. 0. *flam.* 10.

Fem. *Cal.* 1-phyllus : squama ciliata.
cor. 0. *germina* 2. *styli* singulis 2.
Nux ovata.

681. *Betulus*. squamis strobilorum planis. CHARME.
Carpinus. T.

CORYLUS. Masc. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, squamifor-

mis , 1-florus cor. o. *stam.* 8.

Fem. *Cal.* 2-phyllus , lacerus. cor. o.
styli 2. *nux* ovata.

682. *Avelana*. stipulis ovatis obtusis. COUDRIER. NOISETIER. *Corylus sylvestris* *nucibus* in ramum congestis. T.

Monadelphica.

PINUS. Masc. *Cal.* 4-phyllus. cor. o. *stam.* plurima:
antheræ nudæ.

Fem. *Cal.* strobili : squama 2-flora. cor. o.
pist. 1. *nux* ala membranacea excepta.

683. *Sylvestris*. foliis geminis , primordialibus solitariis glabris. PIN SAUVAGE. *Pinus sylvestris vulgaris* Genevensis. T.

684. *Pinea*. foliis geminis : primordialibus solitariis ciliatis. PIN CULTIVÉ. *Pinus sativa* T.

685. *Larix* foliis fasciculatis obtusis. MELEZE. *Larix folio deciduo conifera*. T.

686. *Picea*. foliis solitariis emarginatis. SAPIN ORDINAIRE. *Abies taxifolio* , fructu sursum spectante. T.

687. *Abies*. foliis solitariis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis. SAPIN ÉLEVÉ. PESSE. PICEA. *Abies tenuiore folio* , fructu deorsum inflexo. T.

CUPRESSUS. Masc. *Cal.* amenti squama. cor. o. *antheræ* 4 , sessiles absque filamentis.

Fem. *Cal.* strobili : squama 1-flora.
cor. o. *styli* ? puncta concava.
nux angulata.

688. *Sempervirens*. foliis imbricatis , frondibus quadrangulis. CYPRÉS. *Cupressus meta* in fastigium convoluta s. *fœmina*. c. ramos extra se spargens seu mas. T.

CROTON. Masc. *Cal.* cylindricus ; 5-dentatus : cor.
5-petala. *stam.* 10-15.

Fœmina

Fem. *Cal.* polyphyllus. *cor.* o *styli* 3, bifidi. *caps.* 3-locularis. *sem.* 1.

689. *Tinctorium*. foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. FAUSSE MORELLE. Ricinoides ex quâ paratur tournesol Gallorum. T.

RICINUS. Masc. *Cal.* 5-partitus. *cor.* o. *stam.* numerosa.

Fem. *Cal.* 3-partitus. *cor.* o. *styli* 3, bifidi. *caps.* 3-locularis. *sem.* 1.

690. *Communis*. foliis peltatis subpalmatis ferratis. RICIN. PALMA-CHRISTI. Ricinus vulgaris. T.

Syngenesia.

MOMORDICA. Masc. *Cal.* 5-fidus. *cor.* 5-partita. *filamenta* 3.

Fem. *Cal.* 5-fidus. *cor.* 5-partita. *stylus* 3-fidus. *pomum* elastice diffiliens.

691. *Balsamina*. pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patentipalmatis. POMME DE MERVEILLE. Momordica vulgaris. T.

692. *Elaterium*. pomis hispidis, cirrhis nullis. CONCOMBRE SAUVAGE. Cucumis sylvestris asininus dictus. T.

CUCURBITA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-fida. *filamenta* 3.

Fem. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-fida. *pist.* 3-fidum. *pomi* semina marigine tumida.

693. *Lagenaria*. L. T. foliis subangulatis tomentosis, basi subtus biglandulosis. pomis lignosis. CALEBASSE. COURGE DE PELERIN.

694. *Pepo*. foliis lobatis, pomis obovatis, cirrhis septem-digitatis. COURGE. Pepo oblongus. T.

CUCUMIS. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-partita. *filamenta* 3.

Fem. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-partita. *pist.*

3-fidum. *pomi* semina arguta.

695. *Colocynthis*. foliis multifidis, pomis globosis glabris.
COLOQUINTE. *Colocynthis*, fructu rotundo, major. T.

696. *Melo*. foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. MELON. *Melo* vulgaris. T.

697. *Sativus*. foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. CONCOMBRE. *Cucumis sativus* vulgaris. T.

BRYONIA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-partita. *filamenta* 3.

Fem. *Cal.* 5 dentatus. *cor.* 5-partita. *stylus* 3-fidus. *bacca* subglobosa, polysperma.

698. *Alba*. foliis palmatis utrinque calloso scabris.
BRIOINE BLANCHE. COULEUVRÉE. *Bryonia alba*, foliis rubris. T.

CLASSIS XXII^a. DIÆCIA.

Diandria.

SALIX. Masc. *Amenti squamæ. cor.* o. *glandula* bascos nectarifera.

Fem. *Amenti squamæ. cor.* o. *stylus* 2-fidus. *caps.* 1-locularis, 2-valvis. *sem.* papposa.

699. *Caprea*. foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis, undatis, superne denticulatis. SAULE MARCEAU. *Salix latifolia* rotunda. f. folio ex rotunditate acuminato. T.

700. *Alba*. foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. SAULE BLANC. *Salix vulgaris alba* arborescens. T.

Triandria.

OSYRIS. Masc. *Cal.* 3-fidus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 3-fidus. *cor.* o. *stylus* 1. *stigma*
subrotundum. *bacca* 1-locularis.

701. *Alba.* CASIE POËTIQUE. *Casia* poëtica Monspe-
liensium, an Theophrasti. T.

Tetrandria.

VISCUM. Masc. *Cal.* 4-partitus. *cor.* o. *filam.* o. *anthe-*
ræ calyci adnatæ.

Fem. *Cal.* 4-phyllus, superus. *stylus* o. *cor.*
o. *bacca* 1-sperma. *sem.* cordatum.

702. *Album.* foliis lanceolatis obtusis, caule dichoto-
mo, spicis axillaribus. GUI. *Viscum* baccis albis. T.

Pentandria.

PISTACIA. Masc. *Amenti cal.* 5-fidus. *cor.* o.

Fem. *Distincta. cal.* 3-fidus. *cor.* o. *stylus*
3. *drupa* monosperma.

703. *Vera.* foliis impari pinnatis : foliolis subovatis re-
curvis. PISTACHIER. *Terebinthus* indica Theo-
phrasti, seu pistacia dioscoridis. T.

704. *Terebinthus.* foliis impari pinnatis : foliolis ovato-
lanceolatis. TEREBINTHE. *Terebinthus* vulgaris
T.

705. *Lentiscus.* foliis abruptè pinnatis : foliolis lanceo-
latis. LENTISQUE. *Lentiscus* vulgaris. T.

SPINACIA. Masc. *Cal.* 5-partitus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 4-fidus. *cor.* o. *styli* 4. *sem.* 1.
intrà calycem. induratum.

706. *Oleracea.* fructibus sessilibus. ÉPINARD. *Spinacia*
mas & fœmina. T.

CANNABIS. Masc. *Calyx* 5-partitus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 1-phyllus, integer, latere

hians. *cor.* o. *styli* 2. *nux* 2-valvis,
intrà calycem clausum.

707. *Sativa*. foliis digitatis. CHANVRE. Cannabis mas & fœmina. T.

HUMULUS. Masc. *Cal.* 5-phyllus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 1-phyllus, oblique patens,
integer. *cor.* o *styli* 2. *sem.* 1. in-
trà calycem foliatum.

708. *Lupulus*. HOUBLON. Lupulus mas, & fœmina. T.

Hexandria.

TAMUS. Masc. *Cal.* 6-partitus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 6-partitus. *cor.* o. *stylus* 3-fidus.
bacca 3-locularis, infera. *sem.* 2.

709. *Communis*. foliis cordatis indivisis. SEAU DE NO-
TRE-DAME. Tamus racemosa flore minore luteo
pallescente. T.

SMILAX. Masc. *Cal.* 6-phyllus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 6-phyllus. *cor.* o. *styli* 3. *bacca*
3-locularis. *sem.* 2.

710. *Aspera*. Caule aculeato angulato, foliis dentato-
aculeatis cordatis novem-nerviis. SMIGUET PI-
QUANT. Smilax aspera fructu rubente. T.

Oclandria.

POPULUS, Masc. *Amenti cal.* lamina lacera. *cor.*
turbinata, obliqua, integra.

Fem. *Amenti cal.* & *cor.* maris. *stygma*
4-fidum. *caps.* 2-locularis. *semina*
multa papposa.

711. *Alba*. foliis subrotundis, dentato-angulatis subtus
tomentosis. PEUPLIER BLANC. populus alba ma-
joribus . . . minoribus . . . foliis. T.

712. *Nigra*. L. T. foliis deltoidibus acuminatis ferratis.
PEUPLIER NOIR. Populus nigra, foliis acumina-
tis, dentatis, ad marginem undulatis. Duhamel.
Populus italica varietas,

713. *Balsamifera*. foliis ovatis ferratis subtus albidis , stipulis resinosis. BAUMIER. TACAMAHACA. Populus nigra folio maximo , gemmis balsamum odoratissimum fundentibus. *Catesb. Carol.*

Enneandria.

- MERCURIALIS. Masc. *Cal.* 3-partitus. *cor.* o. *stam.* 9 seu 12. *antheræ* globosæ , didymæ.
Fem. *Cal.* 3-partitus. *cor.* o. *styli* 2. *caps.* dicocca , 2-ocularis , 1-sperma.

714. *Annua*. caule brachiato , foliis glabris , floribus spicatis. MERCURIALE. Mercurialis testiculata sive mas (spicata femina) dioscoridis & plinii. T.

Decandria.

- CORIARIA. Masc. *Cal.* 5-phyllus. *cor.* 5-petala calyci simillima , connexa. *antheræ* bipartitæ.

- Fem. *Cal.* 5-phyllus. *cor.* maris. *styli* 5. *sem.* 5 , petalis succulento bacca-
tis tecta.

715. *Myrtifolia*. foliis ovato-oblongis. REDOU.

Monadelphia.

- JUNIPERUS. Masc. *Amenti. cal.* squamæ. *cor.* o. *stamina* 3.

- Fem. *Cal.* 3-partitus. *petala* 3. *styli* 3 , *bacca* 3-sperma , tribus tuberculis calycis inæqualis.

716. *Sabina*. foliis oppositis erectis decurrentibus : oppositionibus pyxidatis. SABINE. Sabina folio cupressi. T.

717. *Communis*. foliis ternis patentibus mucronatis ,

bacca longioribus. GENEVRIER. Juniperus vulgaris. T.

718. *Oxycedrus*. foliis ternatis patentibus mucronatis bacca brevioribus. CADE. Juniperus major, bacca rufescente. T.

719. *Phænicea*. foliis ternis oblitteratis imbricatis obtusis. CEDRE A FRUIT BLANC. Cedrus folio cupressi, major, fructu flavescente. T.

720. *Lycia*. foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. CEDRE LYCIEN. Cedrus folio cupressi, media majoribus baccis. T.

TAXUS. Masc. *Cal.* 3-phyllus gemmæ. *cor.* o. *stam.* multa. *antheræ* peltatæ octofidæ.

Fem. *Cal.* 4-phyllus gemmæ. *cor.* o. *styli* o. *sem.* 1, calyculo baccato, integerrimo.

721. *Baccata*. foliis approximatis. IF. taxus. T.

Syngenesia.

RUSCUS. Masc. *Cal.* 6-phyllus. *cor.* o. *nectarium* centrale, ovatum, apice perforatum.

Fem. *Calyx*, *cor.* & *nectarium* maris. *styli* 1. *baeca* 3 locularis. *sem.* 2.

722. *Aculeatus*. foliis suprâ floriferis nudis. HOUX FRELON. PETITHOUX. Ruscus myrtifolius aculeatus. T.

723. *Hypoglossum*. foliis subtus floriferis sub foliolo. FAUX LAURIER ALEXANDRIN. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente. T.

CLASSIS XXIII^a. POLYGAMIA.

Monœcia.

VERATRUM. Hermaphrod. *Cal.* o. *cor.* 6-petala. *stam.* 6. *pist.* 3. *caps.* 3. polyspermæ.

Masc.

Cal. o. *cor.* 6-petala.
ſtam. 6 .*piſtilli* rudimentum.

724. *Album.* Racemo ſupradecompoſito , corollis erectis. HELLEBORE BLANC. Veratrum flore ſubviridi. T.

VALANTIA. Hermaphrod. *Cal.* o. *cor.* 4-partita. *ſtam.* 4. *ſtylus* 2-fidus. *ſemen* 1.

Masc.

Cal. o. *cor.* 3. f. 4-partita.
ſtam. 3. f. 4. *piſtillum* obſoletum.

725. *Cruciata.* floribus masculis quadrifidis , pedunculis diphyllis. CROISETTE VELUE. *Cruciata* hirsuta. T.

PARIETARIA. Hermaphrod. *Cal.* 4-fidus. *cor.* o. *ſtam.* 4. *ſtyl.* 1. *ſem.* 1. ſuperum , elongatum.

Fem.

Cal. 4-fidus. *cor.* o. *ſtam.* o. *ſtyl.* 1. *ſem.* 1. ſuperum , elongatum.

726. *Officinalis.* foliis lanceolato-ovatis , pedunculis dichotomis , calycibus diphyllis. PARIETAIRE. *Parietaria* officinarum & dioſcoridis. T.

ATRIPLEX. Hermaphrod. *Cal.* 5-phyllus. *cor.* o. *ſtam.* 5. *ſtylus* 2-partitus. *ſem.* 1. depreſſum.

Fem.

Cal. 2-phyllus. *cor.* o. *ſtam.* o. *ſtylus* 2-partitus. *ſem.* 1 ; compreſſum.

727. *Hortensis.* caule erecto herbaceo , foliis triangularibus. ARROCHE. *Atriplex* hortenſis alba , ſeu palide virens. Atr. H. rubra. T.

ACER. Hermaphr. *Cal.* 5-fidus. *cor.* 5-petala. *ſtam.* 8. *piſt.* 1. *capſ.* 2. f. 3. monospermæ , ala terminatæ.

Masc.

Cal. 5-fidus. *cor.* 5-petala. *ſtam.* 8.

728. *Pseudo-Platanus.* foliis 5-lobis inæqualiter ſerratis , floribus racemosis. ERABLE-SYCOMORE. *Acer* montanum candidum. *Acer* majus foliis eleganter variegatis. T.

CELTIS. Hemaphr. *Cal.* 5-partitus. *cor.* o. *stam.* 5.
styli 2. *drupa* 1-sperma

Masc. *Cal.* 6-partitus. *cor.* o. *stam.* 6.

729. *Australis.* foliis ovato-lanceolatis. MICOCOULIER.
Celtis fructu nigricante. T.

Diœcia.

FRAXINUS. Hermaphr. *Cal.* o. f. 4-partitus. *cor.* o. f.
 4-petala. *stam.* 2. *pist.* 1. *sem.*
 lanceolatum.

Fem. *Sem.* 1. lanceolatum.

730. *Excelsior.* L. T. foliolis ferratis, floribus apetalis.
 FRENE.

731. *Ornus.* foliolis ferratis, floribus corollatis. FRENE
 A FLEUR. *Fraxinus florifera botryoides.* T.

Triœcia.

CERATONIA. Hermaphr. *Cal.* 5-partitus. *cor.* o. *stam.*
 5. *stylus* filiformis. *legumen*
 coriaceum polyspermum.

Dioica. Mas & femina distincta.

732. *Siliqua.* CAROUBIER. *Siliqua edulis.* T.

FICUS. *Receptaculum* commune turbinatum, carnosum,
 connivens, occultatis flosculos vel in
 eodem vel distincto.

Masc. *cal.* 3-partitus *cor.* o. *stam.* 3.

Fem. *cal.* 5-partitus. *cor.* o. *pistil.* 1. *sem.* 1.

733. *Carica.* foliis palmatis. FIGUIER COMMUN. *Ficus*
 communis. T.

CLASSIS XXIV^a. CRYPTOGAMIA.

Filices.

EQUISETUM. *Spica* fructificationibus peltatis basi
 dehiscentibus multivalvi.

734. *Arvense*. scapo fructificante nudo ; sterili frondoso.
PRELE DES CHAMPS. Equisetum arvense longiori-
bus setis. T.

735. *Fluviatile*. caule striato , frondibus subsimplicibus.
PRELE DES RIVIERES. Equisetum palustre longio-
ribus setis. T.

OPHIOGLOSSUM. *Spica* articulata , disticha : articu-
lis transversim dehiscentibus.

736. *Vulgatum*. L. T. fronde ovata. LANGUE DE SÉR-
PENT.

OSMUNDA. *Spica* ramosa. *fructificat.* globosis.

737. *Regalis*. Frondibus bipinnatis , apice racemife-
ris. OSMONDE ROYALE. FOUGERE FLEURIE. Of-
munda vulgaris & palustris. T.

PTERIS. *fructific.* in lineis marginalibus.

738. *Aquilina*. frondibus supradecompositis : foliolis
pinnatis : pinnis lanceolatis : infimis pinnatifidis :
superioribus minoribus. FOUGERE FEMELLE. PTE-
RIS AQUILIN. Pteris ramosa , major , pinnulis ob-
tusis , non dentatis. T.

ASPLENIUM. *fructific.* in lineolis disci frondis sparsis.

739. *Scolopendrium*. frondibus simplicibus cordato-lin-
gulatis integerrimis , stipitibus hirsutis. SCOLO-
PENDRE. LANGUE DE CERF. Lingua cervina offi-
cinarum. T.

740. *Ceterach*. frondibus pinnatifidis : lobis alternis con-
fluentibus obtusis. DORADILLE CÉTÉRACH. As-
plenium sive ceterach. T.

741. *Trichomanes*. frondibus pinnatis ; pinnis subrotun-
dis crenatis. DORADILLE POLITRIC. Trichomanes
seu politrichum officinarum. T.

742. *Ruta muraria*. frondibus subtripinnatis : foliis al-
ternis : pinnis lanceolatis inciso-ferratis. DORADIL-
LE DES MURS. SAUVE VIE. Ruta muraria. T.

743. *Adiantum nigrum*. frondibus subtripinnatis : folio-
lis alternis : pinnis lanceolatis inciso ferratis. DORA-
DILLE CAPILLAIRE. filicula quæ adiantum ni-
grum officinarum , pinnulis obtusioribus. T.

POLYPODIUM. *fructif.* in punctis subrotundis , sparsis per discum frondis.

744. *Vulgare.* L. T. frondibus pinnatifidis : pinnis oblongis subserratis obtusis , radice squamatâ. **POLYPODE COMMUN.** T.

745. *Filix mas.* frondibus bipinnatis : pinnis obtusis crenulatis , stipite paleaceo. **POLYPODE. FOUGERE MÂLE.** Filix non ramosa dentata. T.

746. *Filix femina.* fronde bipinnata : pinnulis lanceolatis , pinnatifidis acutis. **POLYPODE. FOUGERE FEMELLE.** Filix mollis , sive glabra , vulgari mari non ramosæ accedens. T.

747. *Aculeatum.* frondibus bipinnatis : pinnis lunulatis ciliato dentatis stipite strigoso. **POLYPODE POINTU.** Filix aculeata repens. T.

ADIANTUM. *fructificationes* in maculis terminalibus sub replicato margine frondis.

748. *Capillus veneris.* frondibus decompositis : foliis alternis : pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. **CAPILLAIRE DE MONTPELLIER.** Adiantum foliis coriandri T.

Musci.

LYCOPODIUM. *Anthera* bivalvis , sessilis. *Calyptra* nullâ.

749. *Clavatum.* foliis sparsis filamentosis , spicis teretibus pedunculatis geminis. **LYCOPODE A MASSUE.** Muscus squamosus , vulgaris , repens , clavatus. T.

POLYTRICUM. *Anthera* operculata , apophysi inimiçæ insidens. *calyptra* villosa. *stella* femineâ in distincto individuo.

750. *Commune.* caule simplici , antherâ parallelipipedâ. **POLYTRIC COMMUN. PERCE-MOUSSE.** Muscus capillaceus major , pediculo & capitulo crassioribus. T.

Algæ.

MARCHANTIA. Masc. *Cal.* peltatus , subtus testus.
cor. 1-petalis : *antheræ* multifidæ.

Fem. *Cal.* sessilis , campanulatus ,
 polyspermus.

751. *Polymorpha.* calyce communi decemfido. *HÉPATIQUE DE FONTAINE.*

LICHEN. Masc. *Receptaculum* subrotundum , planiusculum nitidum.

Fem. *Farina* foliis adspersa.

752. *Islandicus.* foliaceus adscendens laciniatus : marginibus elevatis ciliatis. *LICHEN D'ISLANDE.*

753. *Pulmonarius.* foliaceus laciniatus obtusus glaber : suprà lacunofus ; subtus tomentosus. *LICHEN PULMONAIRE. PULMONAIRE DE CHENE.* Lichen arboreus , sive pulmonaria arborea. T.

754. *Parellus.* crustaceus albus peltis concavis obtusis pallidis. *PARELLE D'Auvergne.* T. It. 1. 233.
Fungi.

AGARICUS. *Fungus* horizontalis , subtus lamellosus.

755. *Quercinus.* acaulis , lamellis labyrinthiformibus. *AGARIC DE CHENE.* Agaricus dedaleis sinibus excavatus. T.

LYCOPERDON. *Fungus* subrotundus , feminibus farinaceis repletus.

756. *Tuber.* globosum solidum muricatum , radice destitutum. *TRUFFE.* Tubera. T.

757. *Bovista.* subrotundum , lacerato dehiscens. *VERSE DE LOUP COMMUNE.* Lycoperdon vulgare. T.

Palmæ.

PHŒNIX. Masc. *Cal.* 3-partitus. *cor.* 3-petala. *stam.* 3.

Fem. *Cal.* 3-partitus. *cor.* 3-petala. *pist.* 1.
drupa ovata *dactylifera.* frondibus pinnatis : foliolis complicatis ensiformibus. *DATTIER.*

